

© видання для лікаря-практика



Клінічна імунологія Алергологія Інфектологія

III Національний конгрес
з імунології, алергології
та імунореабілітації
в Україні

Профілактика рака
посредством
модификации питания:
возможно ли
невозможное?

Значимость
персонифицированного
подхода в диагностике
аллергической патологии



ПІДГОТУЙТЕСЯ
ДО НАПАДУ
АНАФІЛАКСІЇ
ДОВІРТЕСЯ ДОКАЗАМ

ЕПІПЕН®

Адреналін Шприц-ручка 0,3 мг

Рекомендації ЕААСІ¹:

Абсолютні показання

- Випадки анафілактичної реакції на продукти харчування, латекс або аероалергени в анамнезі
- Анафілаксія, викликана фізичними вправами
- Ідіопатична анафілаксія
- Поєднання нестабільної астми або персистуючої астми помірного та важкого ступеня з харчовою алергією
- Алергія на отруту тваринного походження у дорослих (які не отримують підтримуючої імунотерапії отрутою) з системними реакціями та дітей з системними реакціями, поширеними за межі шкіри та слизових оболонок
- Розлади функції тучних клітин або підвищення основного рівня концентрації триптази в сироватці разом з попередніми системними алергічними реакціями на укуси комах, навіть у пацієнтів, які отримують імунотерапію отрутою

Слід розглянути необхідність призначення хоча б однієї шприц-ручки з адреналіном

- Алергічні реакції легкого та помірного ступеня тяжкості на арахіс та/або горіхи, що ростуть на деревах
- Підлітки та дорослі з харчовою алергією
- Віддаленість медичної допомоги та алергічні реакції легкого та середнього ступеня тяжкості на продукти харчування, отруту тваринного походження, латекс та аероалергени
- Алергічні реакції легкого та середнього ступеня тяжкості на продукти харчування в незначній кількості



Склад: 1 мл розчину містить 1 мг адреналіну, 1 доза (0,3 мл) містить 0,3 мг адреналіну. Лікарська форма: розчин для ін'єкцій. Протипоказання. Немає відомо абсолютних протипоказань при застосуванні Епіпену під час невідланої допомоги при алергічних реакціях. Особливості застосування. Пацієнти мають бути поінформовані, що у разі виникнення анафілактичного шоку необхідно викликати швидку допомогу. Лікарський засіб застосовують внутрішньом'язово у передню поверхню стегна. Пацієнти мають бути поінформовані, що препарат не вводять у судини. Термін придатності. 20 місяців. Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці для захисту від світла. Не заморозувати. Категорія відпуску. За рецептом.

Література: 1. Muraro A. et al. Anaphylaxis. guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2014, 69: 1026-1045

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Матеріал для розповсюдження на конференціях та круглих столах. Для детальної інформації дивись інструкцію для медичного застосування лікарського засобу.

Представництво «МЕДА Фармасейтікалс Селтсленд ГмбХ» в Україні
01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б, поштом 6. Тел. +380 (044) 482 15 51
www.meda.ua
МЕДА (A Mylan company)

МЕДА



Видавничий дім «Здоров'я України. Медичні видання»
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія

Видання для лікаря-практика

Журнал заснований у серпні 2005 р.

Періодичність виходів: 8 номерів + 3 спецвипуски + збірник клінічних рекомендацій

Видання входить до електронної бази даних «Наукова періодика України НБУ імені В.І. Вернадського» та індексується Google Scholar

Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського



ЗМІСТ

№ 4 (109) 2018

Огляд

Инфекционные и неинфекционные причины
лихорадки у пациентов с печеночной недостаточностью
И.В. Евстигнеев 5

Дайджести

Порівняння активності цетиризину та дезлоратадину
щодо гістамін-індукованої реакції у вигляді появи
пухирів і почервоніння протягом 24 годин
A. Purohit, M. Melac, G. Pauli et al. 10

Рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження
цетиризину та лоратадину у дітей з сезонним
алергічним ринітом
A.S. Nayak, W.E. Berger, C.F. LaForce et al. 10

Подія

III Національний конгрес з імунології, алергології
та імунореабілітації в Україні 12

Актуальні питання та практичні аспекти
дитячої пульмонології та алергології:
стандарти медичної допомоги 26

Клінічні випадки

Значимість персонифіцированого підхода
в диагностике аллергической патологии
Е.В. Шарикадзе, Е.Д. Москобенко 33

Профілактична медицина

Профилактика рака посредством модификации
питания: возможно ли невозможное?
А.Б. Бизунков 42

Сторінки історії

Штрихи к успешней эпохе: от «расовой гигиены»
до преступного медицинского эксперимента
Э.М. Ходош 50



**Вартість передплати
на II півріччя 2018 р. – 280 грн.**

Оформити передплату
на наше видання можна
у будь-якому відділенні зв'язку
за каталогом «Укрпошти»
в розділі «Охорона здоров'я
України. Медицина».

**Передплатний індекс –
94977**

Реквізити:

ТОВ «Медичний журнал «Клінічна
імунологія. Алергологія.
Інфектологія.», 03035 м. Київ,
вул. Механізаторів, 2,
ЄДРПОУ 38391854.
П/р 2600 363 646 6100
в ПАТ «УкрСиббанк»,
МФО 351005.