





№ 10 (88) 2015

## Содержание

### АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Венозный тромбоз эмболизм в акушерстве  
Основные положения международных  
и национальных рекомендаций  
В.И. Медведь ..... 5

Недержание мочи у женщин  
и его консервативная коррекция  
П.Н. Веропотвелян, И.С. Пехмистренко,  
Н.П. Веропотвелян, М.И. Гламазда ..... 49

### МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Гиперпролактинемия как междисциплинарная проблема:  
от причин к последствиям  
Т.Ф. Татарчук, Н.А. Гук, С.Р. Галич, В.А. Потапов,  
О.В. Грищенко ..... 10

Унифицированный клинический протокол первичной та вторичной  
(специализированной) медицинской помощи «Залізодефіцитна анемія»  
Наказ МОЗ України від 2 листопада 2015 р. № 709 ..... 19

Гендерные особенности диагностики, течения и лечения  
ишемической болезни сердца  
В.В. Бугаенко, И.П. Голикова, М.Ю. Шеремет ..... 53

### ОНКОЛОГИЯ

Назначение экзестана после лечения тамоксифеном  
улучшает исходы РМЖ у женщин  
постменопаузального возраста ..... 42

### ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Анонс ..... 66

Книжная полка ..... 48

Личный гид на 2016 год ..... 68

**тотема**  
ЗІЗІСО, МІДІ, МАРГАНЦЮ

**ОРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ —  
ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ**



тотема  
Mn Cu

- Швидка гематологічна відповідь<sup>1</sup>
- Органічні солі заліза, міді та марганцю<sup>2</sup>
- Можливе застосування під час вагітності<sup>3</sup>
- Дозволено дітям з 1-го місяця<sup>2</sup>
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ<sup>3</sup>



<sup>1</sup> С.В. Свєдичин. Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: тематический ответ и улучшение качества жизни «Земский врач», № 1, 2012, стр. 37-42.

<sup>2</sup> Инструкция для медицинского использования.

<sup>3</sup> WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments – October 2013).

**Склад лікарського засобу:** 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді залізоглюконату) 50 мг, марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг, міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг. **Показання для застосування.** Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. **Протипоказання.** Надлишок заліза в організмі. Регулярні гемотранфузії. Одночасне застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізо-рефрактерна анемія. Анемія, пов'язана з недостатністю медуллярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Спадкова непереносимість фруктози.

**Спосіб застосування та дози.** Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям віком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії.

**Профілактика анемії та залізодефіциту:** для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула) на день протягом другого та третього триместрів вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності.

**Побічні ефекти.** З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, печія, запор, діарея. Можливе тимчасове забарвлення випорожнень у чорний колір, що не має клінічного значення та ніяких наслідків для здоров'я. Можлива тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести препарат у відповідному напої та під час застосування не тримати його довго в роті порожниці. Можливі алергічні реакції (свербіж, висипання, набуття еритеми, анафілактична реакція); біль у животі, блювання. Категорія вагітності: без ризику.

Регистраційне посвідчення МНУ/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 24.06.2013

LABORATOIRES  
**innotech**  
INTERNATIONAL

Українська філія: ТОВ «Іннотек Україна»  
вул. Київська, 10, м. Київ, 01010  
Тел: (044) 278-0138