



Медицинские аспекты здоровья женщины

№ 6 (103)' 2016

Контрацепція у підлітковому віці

К вопросу об организации скрининга
рака шейки матки в Украине

Негормональное лечение
вазомоторных симптомов климактерия

Вплив фази менструального циклу
на частоту виникнення
гострого неускладненого пієлонефриту
у жінок репродуктивного віку



Медицинские аспекты здоровья женщины

Медичні аспекти здоров'я жінки

Журнал для врача-практика

Учрежден в июле 2006 г.

Периодичность издания — 8 выходов в год

Журнал представлен в базе данных «Научная периодика Украины» и индексируется Google Scholar

№ 6 (103) 2016

Содержание

ГИНЕКОЛОГИЯ

Современные подходы к ведению пациенток с дисменореей

П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко,
Н.П. Веропотвелян. 28

Негормональное лечение

вазомоторных симптомов климактерия 55

К вопросу об организации скрининга рака шейки матки в Украине

Н.Ф. Лигирда, В.С. Свиницкий 67

АКУШЕРСТВО

Предупреждение материнской смертности вследствие кровопотери

..... 22

Лікування закрепи у вагітних

Інформаційний лист

В.І. Медведь, І.М. Грицай 46

Основные подходы к лечению изжоги во время беременности

М.В. Майоров, Е.А. Жуперкова,
С.И. Жученко, О.Л. Черняк 49

КОНТРАЦЕПЦИЯ

Контрацепция у подростковом возрасте

І.Б. Вовк 5

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Зв'язок магній-дефіцитного стану та антропометричних і клініко-нутрицивних параметрів жінок у постменопаузі

..... 37

Вплив фази менструального циклу на частоту виникнення гострого неускладненого пієлонефриту у жінок репродуктивного віку

С.П. Пасечніков, М.В. Мітченко, П.О. Самчук. 41

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Дайджесты 36, 40, 48, 73

Анонс 21, 66

К 3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСНА
НАУКОВО-МЕДИЧНА
БІБЛІОТЕКА

ФАРМАТЕКС

французский контрацепт
з доведеною ефективністю



Мета-аналіз²

- 15 клінічних досліджень, проведених у Європі
- 3037 жінок/ 32218 циклів



Виключно місцева дія

- не впливає на гормональний фон
- не проникає у кров та грудне молоко
- застосування можна припинити в будь-який час

Застосування Фарматекс особливо доцільне:

- при наявності протипоказань до використання КОК або ВМС;
- у післяпологовий період та у період годування груддю;
- при необхідності епізодичного запобігання вагітності;
- при застосуванні пероральної контрацепції, якщо жінка забула вчасно прийняти таблетку;
- як допоміжний засіб при бар'єрній контрацепції.

ВАГІНАЛЬНІ ТАБЛЕТКИ



- ♥ Контрацептивний ефект настає через 10 хвилин і діє 3 години

Найбільш рекомендовано при надмірній секреції

ВАГІНАЛЬНІ СВІЧКИ



- ♥ Контрацептивний ефект починається через 5 хвилин і діє 4 години

Рекомендовано як при сухості, так і при нормальній секреції піхви

ВАГІНАЛЬНИЙ КРЕМ



- ♥ Контрацептивний ефект починається відразу після введення й продовжується 10 годин

Зволожуюча форма

¹ Інструкція до застосування препарату Фарматекс.
² MARMOR D. Spermicidal intravaginal contraception. Gynecology, Obstet & Fertil. 2001; 29: 1-6

LABORATOIRE
INNOTESCH INTERNATIONAL
Представництво «Лабораторія Іннотекс Інтернаціонал»
Київ 01001, вул. М. Житомирська, 6, тел.: (044) 278-1111

* Матеріал є спеціалізованим і адресований фахівцям охорони здоров'я. Призначений для використання професійної діяльності медичних або фармацевтичних працівників. Графіковий розклад інформації, в цьому виданні або при поширенні матеріалу на спеціалізованих заходах, є першою чергою виключності України «Про науково-технічну інформацію» №3223XII від 25.06.1993 р. *

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я