



# Медицинские аспекты здоровья женщины

№ 8 (105)' 2016

Новообразования у беременных:  
общие и частные проблемы,  
материнские и перинатальные аспекты

Обезболивание родов: что нового?  
Обзор международных гайдлайнов 2016

Дефицит магния и риск внезапной  
сердечной смерти у женщин

Химиопрофилактика рака:  
что может аспирин?





## Содержание

### АКУШЕРСТВО

Обезболивание родов: что нового?

Обзор международных гайдлайнов 2016

Р.А. Ткаченко ..... 36

### ГИНЕКОЛОГИЯ

Применение гормональной контрацепции

и риск тромботических осложнений

П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко,  
Т.Т. Нарытник, П.С. Горук, Т.В. Шутенко ..... 12

Современные подходы к лечению

эндометриоидных кист яичников

О.С. Шаповал ..... 29

### МЕДИЦИСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Новообразования у беременных: общие и частные проблемы,  
материнские и перинатальные аспекты

В.И. Медведь ..... 5

Дефицит магния и риск внезапной

сердечной смерти у женщин ..... 22

Практический подход к ведению пациенток

с синдромом гиперстимуляции яичников

П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко,  
Н.П. Веропотвелян, П.С. Горук ..... 42

2016 год в научных достижениях

А.Лисица ..... 52

Fast track: хирургические протоколы

ускоренной реабилитации в гинекологии

К.В. Пучков, В.В. Коренная, Н.М. Подзолкова ..... 59

Химиопрофилактика рака: что может аспирин?

А.Б. Бизунков ..... 65

### ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Дайджест ..... 28

КЗ ДНІ ПРОПЕТРОВСЬКА  
ОБЛАСНА  
НАУКОВО-МЕДИЧНА  
БІБЛІОТЕКА

# флебодіа®

600МГ діосмін

## Дві проблеми - одне рішення!



**Полегшення  
симптомів  
лімфовенозної  
недостатності<sup>1,2,3</sup>**

біль • тяжкість • трофічні розлади

1 таблетка  
на добу

Флеботонік та  
ангіопротектор<sup>3</sup>



**Швидке  
зменшення  
симптомів  
геморою<sup>3,4,5,6</sup>**

біль • набряк • кровотеча

3 таблетки  
на добу

**Склад лікарського засобу:** 1 таблетка містить діосмін, що відповідає діосміну безводного чистого 600 мг.

**Фармакотерапевтична група.** Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТС C05C A03.

**Показання для застосування.**

- Для полегшення симптомів, обумовлених лімфовенозною недостатністю, таких як відчуття тяжкості у нижніх кінцівках, біль, трофічні розлади;
- у комплексному лікуванні загострення геморою;
- як додатковий метод лікування підвищеної ламкості капілярів, порушення мікроциркуляції.

**Спосіб застосування та дози.** Для перорального застосування. При хронічній лімфовенозній недостатності: 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Тривалість лікування залежить від показань до застосування та від стадії захворювання. Середня тривалість лікування складає 2 місяці.

При гострому геморої: 2-3 таблетки на день під час прийому їми протягом 7 днів, у разі необхідності, лікування продовжують по 1 таблетці 1 раз на добу до 1-2 місяців. Якщо після лікування геморою залишилися симптоми захворювання, необхідно звернутися до проктолога для корекції лікування. Максимальна добова доза — 1800 мг (3 таблетки).

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на кошеніль червону А (Е 124). Препарату звичайно не рекомендують застосовувати у період годування груддю.

**Побічні ефекти.** Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль.

Категорія відпуску. Без рецепта

Регістраційне посвідчення № UA/8590/01/01 Наказ МОЗ України № 649 від 26.07.2013

<sup>1</sup> R. Barbe Etude de la durée d'action du Diovenor avec contrôle par pléthysmographie, Tribune médicale, 1988, n°270, p49-50.

<sup>2</sup> Cazaubon M. et al. Etude comparative d'acceptabilité, d'efficacité et de tolérance de deux formes galéniques de diosmine 600 mg, dans le traitement des symptômes de la maladie veineuse chronique. Angiologie, 2011, vol.63, n°2.

<sup>3</sup> SmPC Phlebodia 600 mg (diosmin). Im-coated tablet.

<sup>4</sup> Chauvenet M., Libeskind M. Intérêt de la diosmine d'hémisynthèse dans la poussée hémorroïdaire aiguë. Essai multicentrique randomisé en double insu versus placebo. Rev Fr Gastro-Enterol 1994; 303: 3-8.

<sup>5</sup> Kecmanovic D. et al — The use of Phlebodia® in the management of bleeding non-prolapsed haemorrhoids. Acta Chirurgica Iugoslavia 2005, 52, 1, 115-116

<sup>6</sup> Debien P., Denis J. Traitement des signes fonctionnels de la crise hémorroïdaire aiguë: Essai multicentrique, randomisé, diosmine d'hémisynthèse versus association extrait de Ginkgo biloba-heptaminol troxérutine. Med Chir Dig 1996; 25 (5): 259-64.

LABORATOIRE  
**innotech**  
INTERNATIONAL

«Лабораторія Іннотек Інтернаціональ»  
Представництво в Україні: 01001, Київ,  
вул. М. Житомирська, 6, тел. (044) 278 06 38.

Матеріал є спеціалізованим і адресований фахівцям охорони здоров'я. Призначений для використання в професійній діяльності медичних або фармацевтичних працівників. Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або при поширенні матеріалу на спеціалізованих заходах, в першу чергу визначається Законом України «Про науково-технічну інформацію» №3322-ХІІ від 25.06.1993р.