



Медичні аспекти здоров'я жінки

Медицинские аспекты здоровья женщины

№ 2 (107)' 2017

Досвід анестезіологічної амбулаторно-консультативної служби у лікуванні породіль високого ризику

Роль гормонального та обмінного дисбалансу в розвитку порушень obturaційної функції шийки матки та способи його корекції

Визначення передміхурової залози у жінок репродуктивного віку

Генітальний туберкульоз та його роль у патогенезі туберкульозного полісерозиту та перитоніту у жінок



Медичні аспекти здоров'я жінки

Медицинские аспекты здоровья женщины

Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р.

Періодичність видання — 8 разів на рік

Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar



№ 2 (107) 2017

Зміст

АКУШЕРСТВО

- Роль гормонального та обмінного дисбалансу в розвитку порушень
обтураційної функції шийки матки та способи його корекції
І.А. Жабченко, В.Ф. Олешко 5
- Досвід анестезіологічної амбулаторно-консультативної служби
у лікуванні породіль високого ризику
Олександр Йоскович, Р.О. Ткаченко, Даніель Шаталін. 15
- Эктопическая шеечная беременность,
осложненная массивным кровотечением
Клинический случай. 21

ГІНЕКОЛОГІЯ

- Роль пролактина в патогенезі ендометріоза
і можливості корекції його рівня агоністами дофамина
П.Н. Веропотвелян, І.С. Цехмистренко, Н.П. Веропотвелян,
А.А. Бондаренко, В.Н. Костинец 25
- Аспекти лікування захворювань шийки матки, асоційованих
із папіломавірусною інфекцією
В.К. Кондратюк, Н.Є. Горбань, Н.Д. Коблош 35
- Воспалительные заболевания органов малого таза:
роль комбинированной терапии
М.В. Майоров, С.И. Жученко, Е.А. Жуперкова, О.Л. Черняк. . . 58
- Генітальний туберкульоз та його роль у патогенезі
туберкульозного полісерозиту та перитоніту у жінок
І.М. Рудик, А.С. Шатковська, О.І. Полунченко, С.В. Полунченко. . . 65

СЕКСОЛОГІЯ

- Визначення передміхурової залози у жінок репродуктивного віку
О.В. Ромашенко, В.М. Григоренко, В.В. Білоголовська,
М.О. Косюхно, С.М. Мельников. 51

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

- Тромбоцитопенія і можливості їх корекції
в гінекологічній практиці
М.О. Арефьева, В.В. Лисица. 43
- Корекція анемії та запори у вагітних:
вихід із фармакодинамічного тупика
Т.В. Смирнова, М.Г. Лебедева, Х.Ю. Симоновская, Н.Л. Артикова. . . 69

ЗАПИСНА КНИЖКА

- Анонси 57, 68, 73
- Книжкова полиця 42

- Пам'яті Петра Миколайовича Веропотвеляна 24

ТОТЕМА®
залізо, мідь, марганець

**ФРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ –
ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!**



- Швидка гематологічна відповідь¹
- Органічні солі заліза, міді та марганцю²
- Можливе застосування під час вагітності²
- Дозволено дітям з 1-го місяця²
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ³



¹ С.В. Семончик. Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни «Земский врач»; № 1; 2012; стр. 37-42.

² Инструкция для медицинского использования.

³ WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments – October 2013).

Склад лікарського засобу: 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді залізо глюконату) 50 мг; марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг; міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг. Показання для застосування. Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. Протипоказання. Надлишок заліза організму. Регулярні гемотрансфузії. Одночасне застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізодефіцитна анемія. Анемія, пов'язана недостатністю медулярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Спадкова непереносимість фруктози.

Спосіб застосування та дози. Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям віком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії.

Профілактика анемії та залізодефіциту: для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула на день протягом другого та третього триместрів вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності).

Побічні ефекти. З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, печія, закріп, діарея. Можливе тимчасове забарвлення випорожнень у чорний колір, що не має клінічного значення та ніяких наслідків для здоров'я. Можлива тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести розчин препарату у відповідному напої та під час застосування не тримати його довго ротовій порожнині. Можливі алергічні реакції (свербіж, висипання, кропив'янка, анафілактична реакція); біль у животі, блювання. Категорія відпуску. Без рецепта.

Регістраційне посвідчення №UA/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 23.08.2013



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернаціональ» в Україні,
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.