



# Медичні аспекти здоров'я жінки

№ 4 (109)' 2017

Medical aspects  
of woman's health

Медицинские аспекты  
здоровья женщины



**Тематичний випуск: онкологічні захворювання у жінок**

НАСОЛОДА  
ЧИСТОЮ  
І ЛЕГКІСТЮ

**gynodek**  
Гінодек

5 шт. в картонній  
упаковці

ЮРІЯ-ФАРМ

Стратегии снижения риска рака  
молочной железы

Рекомендации Национальной комплексной  
онкологической сети США 2017

Передплатний індекс — 95404





# Медичні аспекти здоров'я жінки

## Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України

Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р.

Періодичність видання — 8 разів на рік

Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar



Національна бібліотека України  
імені В. І. Вернадського



№ 4 [109] 2017

## Зміст

### ОНКОЛОГІЯ

Стратегии снижения риска рака молочной железы Рекомендации Национальной комплексной онкологической сети США 2017 .....	6
Предопухолевые заболевания молочной железы с высоким риском развития инвазивного рака: скрининг, профилактика, лечение А.А. Ковалев .....	15
Адьювантная терапия рака молочной железы Рекомендации Национальной комплексной онкологической сети США 2017 .....	24
Паранеопластичні тромбоцитопенії при солідних пухлинах та можливості їх корекції .....	44

### ГІНЕКОЛОГІЯ

Коррекция дисгормональных нарушений при доброкачественных заболеваниях молочных желез О.А. Ефименко .....	19
Папилломавирусная инфекция — современный взгляд на проблему .....	49
Диагностика функциональной гипоталамической аменореи Практические рекомендации эндокринологического сообщества 2017 .....	54
Определение онкобелка E7 вируса папилломы человека 16-го и 18-го типов при цервикальной патологии у женщин репродуктивного возраста О.В. Качалина, Л.Д. Андосова, Д.Д. Елисеева, С.В. Засыпкина, Г.А. Микаилова .....	60
Оценка общего состояния и качества жизни у пациенток с инфильтративным эндометриозом П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян .....	67

### СЕКСОЛОГІЯ

Конгрес Європейської асоціації сексуальної медицини .....	33
Formation of dyspareunia in women with surgical menopause O. Romashchenko, A. Solovyov, V. Biloholovska, S. Melnykov, O. Bavich, M. Khodzava, N. Mironenko .....	35

### АКУШЕРСТВО

Исследование WOMAN: снижение материнской смертности при раннем применении транексамовой кислоты .....	40
--	----

### ЗАПИСНА КНИЖКА


Дайджести .....	14, 32, 59, 73
Анонси .....	2, 75
Книжкова полиця .....	66

К 3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
ОБЛАСТНА  
НАУКОВО-МЕДИЧНА  
БІБЛІОТЕКА

## ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого  
спектру дії для ефективного  
лікування вагініту\*



**ПОЛІЖИНАКС**  
Застосовувати  
інтравагінально ввечері  
перед сном 1 капсулу на  
добу. Курс лікування -  
12 днів, профілактичний  
курс - 6 днів.

**ПОЛІЖИНАКС  
BIRGO**  
Для застосування  
у дитячій гінекологічній  
практиці.

Вміст 1 капсули вводити  
інтравагінально (попередньо  
відірвавши кінець капсули)  
перед сном протягом 6 днів  
посліп.

Лікування вагініту, спричиненого  
чутливими мікроорганізмами:\*

- бактеріальний вагініт;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*).

Профілактика інфекційних  
ускладнень:\*

- перед встановленням внутрішньо-  
маткового засобу, абортom;
- перед і після діатермокоагуляції  
шийки матки;
- перед пологами.



Представництво «Лабора́торія Іннотек Інтернаціона́ль» в Україні,  
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.  
Тел. (044) 2780638. Виробник: Іннотек Шуві (Франція).

\*Інструкція для медичного застосування препарату ПОЛІЖИНАКС та ПОЛІЖИНАКС BIRGO  
Склад: 1 капсула вагінальна містить ністатину сульфату 35 000 МД, поліміксину В сульфату 35 000 МД, ністатину 100 000 МД.  
Фармакотерапевтична група: Протимікробні та антисептичні засоби для інструкції у гінекології. Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В.  
Код МКХ 10A 51. Показання. Лікування вагініту, спричиненого чутливими до препарату мікроорганізмами, у тому числі: бактеріальний  
вагініт, спричинений бацилою лігеною мікрофлори; рецидивуючий неспецифічний вагініт; вагініт, спричинений грибами роду  
*Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*); вагініт, спричинений мікоплазмовою інфекцією. З метою профілактики інфекційних ускладнень  
Поліжинакс рекомендується застосовувати перед операціями, будь-якого внутрішнього втручання на статевих органах, перед абортom,  
встановленням внутрішньоматкового засобу, перед і після діатермокоагуляції шийки матки, перед проведенням внутрішньоматкової  
та внутрішньоматкової обробки, перед пологами. Протипалковий. Парентеральна чутливість до будь-якого компонента (субстанції  
компонентів) препарату. Через наявність шийної капсули Поліжинакс протипалковий засоби з антибіотиком до сні та сні. Застосовувати у  
період вагітності або годування груддю. У клінічних дослідженнях Поліжинакс на даній час не було відзначено та не повідомлено  
про випадки зменшення ваги розвитку або фетотоксичності. Слід уникати за вагітності, що заважає впливу цього лікарського засобу,  
наприклад, щоб вагітності були-най-менше. Тимчасово зупинити препарат у період вагітності можливе лише за призначенням лікаря  
у тих випадках, коли очікується користь для матері переважає потенційний ризик для плода. Через відсутність даних щодо проникнення  
препарату у грудне молоко застосування цього препарату слід уникати у період годування груддю. Спосіб застосування та дози.  
ПОЛІЖИНАКС. Дорослим застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування - 12 днів, профілактичний  
курс - 6 днів. Не слід переривати курс лікування під час менструації. ПОЛІЖИНАКС BIRGO. Неодобрено застосовувати вагітній жінці  
менструації. Після цього вміст 1 капсули ввести інтравагінально ввечері перед сном, протягом 6 днів поспіль. Не тримати лікування під час  
менструації. Побічні реакції. У подальшому виникає свербіж, реакція місцевого подразнення, включаючи почервогіння, набрят, свербіж,  
своєрідне обоняттє, контактний дерматит. Можлива наявність підвищеної чутливості пацієнтів до доповнених до складу препарату  
інгредієнтів. При застосуванні препарату можливі місцеві реакції, включаючи ангідиозний шок, кропив'янку. При застосуванні  
застосовувати антибіотикостійкі до препарату мікроорганізми. Але у разі вагітності рекомендується тримати лікування препаратом  
ризик виникнення системних токсичних ефектів (печінки, нирок, органів слуху) є мінімальним. Категорія вагітності. За рецептом.  
Регистраційне посвідчення ПОЛІЖИНАКС UA/10193/01/01 Нова МЗД №10193 від 29.12.2014.  
ПОЛІЖИНАКС BIRGO UA/7254/01/01 Нова МЗД №7545 від 07.08.2014.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної  
тематикой та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.