



№ 5 (110)' 2017

Медичні аспекти здоров'я жінки

Medical aspects of woman's health

Медицинские аспекты здоровья женщины



ТАНТУМ РОЗА®

P

бензидамина гидрохлорид

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ВАГИНАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ^{1,2}

- Немедленное уменьшение зуда и жжения
уже через 20 минут³
- Профилактика возникновения рецидивов⁴
- Разрешен к применению при беременности
и лактации⁵

04119, г. Киев, ул. Мельникова, 83-Д, оф. 404
тел.: (044) 538-01-26, факс: (044) 538-01-27

Dileo
FARMA

Краткая характеристика лекарственного средства Тантум Роза® вагинальный раствор 0.1% и гранулы Тантум® Роза по 500 мг для приготовления вагинального раствора.

Тантум Роза® — нестероидное противовоспалительное средство с анальгезирующим и противочесоточным свойствами для вагинального введения. При местном применении имеет такое антибактериальное и местноанестезирующее действие. Применяется при вульвовагинитах различного происхождения, которые характеризуются незначительными выделениями из влагалища, зудом, раздражением, жжением, болью. А также для осуществления личной гигиены в послеродовом периоде. Как правило, Тантум Роза хорошо переносится. Побочное действие иногда может проявляться в виде местного раздражения, зуда, кожных высыпаний. Полный перечень возможных побочных эффектов указан в инструкции для медицинского применения препарата. Производитель лекарственного средства Тантум Роза Азиевде Кимике Руните Ангелини Франческо — АКРАФ — С.п.А. Виа Веккио Дел Вигино, 22 — 60100 Авича (АН), Италия. Информация для специалистов здравоохранения и распространения во время семинаров, конференций, симпозиумов и других научных мероприятий по медицинской тематике.

Тантум Роза, вагинальный раствор 0.1%, Р/С № ЦА/4012/02/01, приказ Министерства здравоохранения Украины № 1267 от 22.11.2016

Тантум Роза, гранулы 500 мг для приготовления вагинального раствора, Р/С № ЦА/4012/01/01, приказ Министерства здравоохранения Украины № 685 от 07.07.2016

1. M. Siroa et al. Differential effect of benzocaine on pro- versus anti-inflammatory cytokine production: lack of inhibition of interleukin-10 and interleukin-1 receptor antagonist. International Journal of Clinical and Laboratory Research, 2000.

2. Носовский В.В., Гудырич Г.Д. Патогенетическая терапия в 2-х томах / глава 10. Воспаление. Материалы ПЕТАР-Медиа, 2013.

3. Сойка А. Е. и др. Исследование эффективности бензидамина (Тантум Роза) в форме вагинального раствора при лечении болей в дискофорта в перинальной области в раннем послеродовом периоде. Журнал «Медицинские социальные проблемы семьи» 1 (том 18), 2013.

4. Обословка Г. А. Особенности современного течения инфекционных процессов половых путей у женщин и пути их коррекции. Эффективная фармакотерапия. Актуальность и гинекология, №5, 2012

5. Инструкция для медицинского заведениям аптекарского заводу Тантум Роза Тантум Роза вагинальный Р/С ЦА/4012/02/01, приказ МОЗ Украины № 1267 від 22.11.2016.



www.mazg.com.ua

Современные представления о патогенезе и лечении воспалительных заболеваний нижних отделов половых путей у женщин

Передплатний індекс – 95404

Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України
Журнал для лікаря-практика

Періодичність видання – 8 разів на рік

Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar



№ 5 (110) 2017

3micm

РЕПРОДУКТОЛОГІЯ

Можливості підвищення природної фертильності

Основні положення Практичного комітету Американського товариства репродуктивної медицини	52
--	----

ГІНЕКОЛОГІЯ

Современные представления о патогенезе и лечении воспалительных заболеваний нижних отделов половых путей у женщин
И. А. Жабченко 5

Современная эстетическая гинекология: в фокусе лазеры, RF,
ботулотоксин, филлеры
Обзор Expert Gynecology Meeting 2017..... 12

Местное лечение вагинальных инфекций
М.В. Майоров, С.И. Жученко, О.Л. Черняк 27

**Вибір методу хірургічного лікування стресового
нетримання сечі у жінок без пролапсу тазових органів**
В.І. Горовий, О.І. Яцина, Л.Ю. Трифонюк, Р.К. Балацький 36

**Аэробный вагинит: терминологические новости
и выбор эмпирической терапии**
И.В. Кузнецова, Е.В. Ших46

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Взгляд иммунолога на проблему иммуноткоррекции в гинекологии
Г.Н. Дранник, И.П. Кайдашев,
И.Я. Господарский, О.А. Гизингер 18


АКУШЕРСТВО

Профилактика и терапия
периоперационной и перипартальной кровопотери
Р.А. Ткаченко..... 24

Случай спонтанно наступившей беременности у пациентки
с синдромом Зиверта – Картагенера 58
С.Р. Мравян, И.О. Шугинин

ЗАПИСНА КНИЖКА

Дайджести	17, 23, 45, 57, 63
Анонси	50, 64, 65, 67



ПОЛІЖИНАКС
Застосовувати
інтравагінально ввечері
перед сном 1 капсулу на
добу. Курс лікування -
12 діб, профілактичний
курс - 6 діб.



**ПОЛІЖИНАКС
ВІРГО**

Для застосування
у дитячій гінекологічній
практиці



Вміст 1 капсули вводити інтравагінально (попередньо відрізвавши кінець капсули) перед сном протягом 6 днів поспіль.

Лікування вагініту, спричиненого чутливими мікроорганізмами:

- бактеріальний вагініт;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*).

Профілактика інфекційних ускладнень:

- перед встановленням внутрішньоматкового засобу, абортom;
- перед і після діатермокоагуляції шийки матки;
- перед пологами.



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні,
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.
Тел. (044) 2780638. Виробник: Іннотек Шузі (Франція).

[illegible]

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.