



Медичні аспекти здоров'я жінки

№ 7-8 (112-113)' 2017

Medical aspects
of woman's health

Медицинские аспекты
здоровья женщины



III міждисциплінарний науковий
конгрес «Актуальні питання інтенсивної
терапії та анестезіологічного забезпечення
в акушерстві, гінекології та неонатології»
Огляд доповідей

Ведення вагітності та пологів при спадкових
порушеннях згортання крові.
Хвороба Віллебранда. Гемофілія

Вирусные гепатиты у женщин
репродуктивного возраста

Нейроендокринні гінекологічні синдроми.
Особливості діагностики і лікування
в дитячому і підлітковому віці



Медичні аспекти здоров'я жінки

Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України

Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р.

Періодичність видання — 8 разів на рік

Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar



№ 7-8 (112-113) 2017

Зміст

АКУШЕРСТВО

III міждисциплінарний науковий конгрес «Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та неонатології»

Огляд доповідей

Patient blood management (управління системою крові пацієнта) у вагітних групі високого ризику

Ю.В. Давидова, Р.А. Ткаченко, А.Ю. Лиманская 6

Інтенсивна терапія політравми у вагітних

С.О. Дубров, Ю.В. Давидова 9

Інсульт у вагітних, рожець і родильниць

В.І. Черний 11

Остановка сердца у вагітних (обзор рекомендацій American Heart Association 2015)

А. Злотник 15

Масивні акушерські кровотечі: ключові питання профілактики і терапії

О.В. Голяновський 13

Ведення вагітності та пологів при спадкових порушеннях згортання крові. Хвороба Віллебранда. Гемофілія

Методологія профілактики більших акушерських синдромів

Ю.В. Тезиков, І.С. Липатов, Н.А. Фролова, О.А. Кутузова, А.В. Приходько 33

ГІНЕКОЛОГІЯ

Нейроендокринні гінекологічні синдроми. Особливості діагностики і лікування в дитячому і підлітковому віці

І.Б. Вовк, О.О. Зелінський 18

Вагінальний кандидоз: соціальні аспекти та сучасні можливості лікування

..... 30

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Доказання ефективності і безпеки лікування ІМП у вагітних: фокус на фосфоміцин

І.А. Зайцев 44

Вирусные гепатиты у женщин репродуктивного возраста

І.А. Зайцев 47

Статини и здоровье женщины: влияние на сердечно-сосудистую и репродуктивную системы

А.С. Исаева, В.И. Волков 53

Современные тенденции в лечении резистентных форм акне

В.А. Савоськина 59

ЗАПИСНА КНИЖКА

Дайджести 8, 16

Анонси 10, 65, 67

флебодіа®

600МГ діосмін

Дві проблеми - одне рішення!



Полегшення симптомів лімфовенозної недостатності^{1,2,3}

біль • тяжкість • трофічні розлади

Флеботонік та ангіопротектор³



Швидке зменшення симптомів геморою^{3,4,5,6}

біль • набряк • кровотеча

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить діосмін, що відповідає діосміну безводного чистого 600 мг.

Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТС C05C A03.

Показання для застосування.

- Для полегшення симптомів, обумовлених лімфовенозною недостатністю, таких як відчуття тяжкості у нижніх кінцівках, біль, трофічні розлади;
- у комплексному лікуванні загострення геморою;
- як додатковий метод лікування підвищеної ламності капілярів, порушення мікроциркуляції.

Спосіб застосування та дози. Для перорального застосування. При хронічній лімфовенозній недостатності: 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Тривалість лікування залежить від показань до застосування та від стадії захворювання. Середня тривалість лікування складає 2 місяці.

При гострому геморої: 2-3 таблетки на день під час прийому їжі протягом 7 днів, у разі необхідності, лікування продовжують по 1 таблетці 1 раз на добу до 1-2 місяців. Якщо після лікування гемороєм залишилися симптоми захворювання, необхідно звернутися до проктолога для корекції лікування. Максимальна добова доза — 1800 мг (3 таблетки).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на носіння червоної А (E 124). Препарату звичайно не рекомендується застосовувати у період годування груддю.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль.

Натертія відпуску. Без рецепта

Реєстраційне посвідчення № UA/8590/01/01 Наказ МОЗ України № 649 від 24.07.2013

¹ R. Barbe Etude de la durée d'action du Diovenor avec contrôle par pléthysmographie, Tribune médicale, 1998, n°270, p49-50.

² Cazeau M, et al. Etude comparative d'acceptabilité, d'efficacité et de tolérance de deux formes galéniques de diosmine 600 mg, dans le traitement des symptômes de la maladie veineuse chronique. Angiologie, 2011, vol.63, n°2.

³ SmPC Flebodia 600 mg (diosmin). (m-coated tablet).

⁴ Chauvenet M, Libeskind M. Intérêt de la diosmine d'hémisynthèse dans la poussée hémorroïdaire aiguë. Essai multicentrique randomisé en double insu versus placebo. Rev Fr Gastro-Enterol 1994; 303: 3-8.

⁵ Kechanov D, et al. — The use of Flebodia® in the management of bleeding non-prolapsed haemorrhoids. Acta Chirurgica Iugoslaviae 2005, 52, 1, 115-116.

⁶ Debieu P, Denis J. Traitement des signes fonctionnels de la crise hémorroïdaire aiguë: Essai multicentrique, randomisé, diosmine d'hémisynthèse versus association extrait de Ginkgo biloba-heptaminol troxerutine. Med Chir Dig 1996; 25 (5): 259-64.



«Лабораторія Іннотек Інтернаціональ»
Представництво в Україні: 01001, Київ,
вул. М. Житомирська, 6.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників