



Медичні аспекти здоров'я жінки



Медицинские аспекты здоровья женщины Специальный выпуск № 1' 2018

ГОРМОНАЛЬНА ТЕРАПІЯ
ТА КОНТРАЦЕПЦІЯ




Нормоцикл®

природна протизапальна дія

Цикл в нормі

ЗАСОСОВУЄТЬСЯ:

- при порушеннях менструального циклу (стрес-індуковані, дисфункціональні маткові кровотечі та ін.)¹
- при дисбалансі ФСГ/ЛГ^{1,2}
- при недостатності другої фази менструального циклу і дисменореї³
- при комплексному лікуванні запальних захворювань органів малого таза та порушень менструального циклу у зв'язку з ними⁴
- при комплексному лікуванні гіперандрогенії, вугрової хвороби^{1,2}
- при комплексному лікуванні фіброміоми, гіперплазії ендометрію¹, фолікулярних кіст, синдрому полікістозних яєчників¹
- при потребі корекції рівня кортизола¹
- при необхідності відновлення менструального циклу після абортів, вишкрібів¹

© 2018 Органосин. Всі права захищені. Додатковий текст на сайті: <http://organosyn.com.ua> та в інформаційному виданні.

Нормоменс®

фітопрогестерон

Баланс гормонів і настрою

ЗАСОСОВУЄТЬСЯ:

- при гіперпролактинемії¹
- при передменструальному синдромі²
- при дисменореї (болюча менструація)⁴
- при масталгії, мастодинії³
- при фіброзно-кістозній мастопатії³
- при безплідді внаслідок недостатності лютеїнової фази⁴
- при естрогензалежних захворюваннях (гіперплазія ендометрію, фіброміома)¹
- при ендометріозі⁴
- при відновленні після абортів та інших внутрішньоматкових втручань¹
- при ановуляторних циклах¹
- при виражених стресорних змінах¹
- жінкам з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров'я^{1,4}
- при перименопаузі для нормалізації циклу, з метою відновлення менструального циклу¹

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ З МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ ТА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАВАННЯХ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ТА ЛІКАРІВ

Бархатний сезон в житті
жінки: як передувити
осложнення



Медичні аспекти здоров'я жінки

Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України

Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р.

Періодичність видання — 8 разів на рік

Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar

Національна бібліотека України
імені В.І. Вернадського

Google
scholar

Спеціальний випуск №1' 2018

Зміст

ГІНЕКОЛОГІЯ

- Бархатний сезон в житті жінки: як предупредити осложнения
Т.Ф. Татарчук, О.В. Рыкова 5
- Менеджмент преждевременной яичниковой недостаточности
Н.В. Косей 20
- Конференция по эстетической гинекологии
Expert Gynecology Meeting 2018 24
- Гиперпролактинемия в гинекологической практике
О.А. Ефименко 27
- Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции
натуропатическими препаратами
Н.А. Цубанова, А.В. Барская, Т.Д. Губченко 48
- Медикаментозный аборт: сравнительная эффективность разных
режимов применения препаратов 56

КОНТРАЦЕПЦИЯ

- Гормональная контрацепция в практике гинеколога.
Вопросы и ответы
Н.Ю. Педаченко, Н.Ф. Захаренко 13
- Практичні аспекти призначення засобів контрацепції підліткам
І.Б. Вовк 34
- Применение мифепристона в качестве средства экстренной
контрацепции
Результаты Кокрановского систематического обзора 2017 ... 42
- Комбінована гормональна контрацепція та ризик виникнення
венозної тромбоемболії
Основні положення керівництва Практичного комітету
Американського товариства репродуктивної медицини 72

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

- Значение сексуального образования в психологии и физиологии
взросления
З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская 30
- Возможности коррекции ортостазозависимой флебопатии у женщин,
применяющих гормонозаместительную терапию
Ю.Т. Цуканов, А.Ю. Цуканов, В.Н. Баженов, И.Ф. Корниенко,
В.В. Василевич 60
- Статины и здоровье женщины: влияние на сердечно-сосудистую
и репродуктивную системы
А.С. Исаева 66

ЗАПИСНА КНИЖКА

- Анонси 19, 47, 64, 65
- Інформаційне повідомлення 41

флебодіа®

600МГ діосмін

Дві проблеми - одне рішення!



**Полегшення
симптомів
лімфовенозної
недостатності^{1,2,3}**

біль • тяжкість • трофічні розлади

1 таблетка
на добу

Флеботонік та
ангіопротектор³



**Швидке
зменшення
симптомів
геморою^{3,4,5,6}**

біль • набряк • кровотеча

3 таблетки
на добу

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить діосмін, що відповідає діосміну безводного чистого 600 мг.

Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТС C05C A03.

Показання для застосування.

- Для полегшення симптомів, обумовлених лімфовенозною недостатністю, таких як відчуття тяжкості у нижніх кінцівках, біль, трофічні розлади;
 - у комплексному лікуванні загострення геморою;
 - як додатковий метод лікування підвищеної ламкості капілярів, порушення мікроциркуляції.
- Спосіб застосування та дози.** Для перорального застосування. При хронічній лімфовенозній недостатності: 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Тривалість лікування залежить від показань до застосування та від стадії захворювання. Середня тривалість лікування складає 2 місяці.

При гострому геморої: 2-3 таблетки на день під час прийому їжі протягом 7 днів, у разі необхідності, лікування продовжують по 1 таблетці 1 раз на добу по 1-2 місяці. Якщо після лікування гемороєм залишилися симптоми захворювання, необхідно звернутися до проктолога для корекції лікування. Максимальна добова доза — 1800 мг (3 таблетки).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на кошеніль червоного А (E 124). Препарат звичайно не рекомендується застосовувати у період годування груддю.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль.

Категорія відпуску. Без рецепта

Регістраційне посвідчення № UA/8590/01/01 Наказ МОЗ України № 649 від 26.07.2013

¹ R. Barbe Etude de la durée d'action du Diovenor avec contrôle par pléthysmographie, Tribune médicale, 1988, n° 270, p.49-50.

² Cazaubon M. et al. Etude comparative d'acceptabilité, d'efficacité et de tolérance de deux formes galéniques de diosmine 600 mg, dans le traitement des symptômes de la maladie veineuse chronique. Angiologie, 2011, vol.63, n°2.

³ SmPC PhleboDIA 600 mg (diosmin). Im-coated tablet.

⁴ Chauvenet M., Libeskind M. Intérêt de la diosmine d'hémisynthèse dans la poussée hémorroïdaire aiguë. Essai multicentrique randomisé en double insu versus placebo. Rev Fr Gastro-Entérologie 1994; 303: 3-8.

⁵ Kecmanovic D. et al. — The use of PhleboDIA® in the management of bleeding non-prolapsed haemorrhoids. Acta Chirurgica Iugoslavia 2005, 52, 1, 115-116.

⁶ Dehien P., Denis J. Traitement des signes fonctionnels de la crise hémorroïdaire aiguë: Essai multicentrique, randomisé, diosmine d'hémisynthèse versus association extrait de Ginkgo biloba-heptaminol troxérutine. Med Chir Dig 1996; 25 (5): 259-64.

LABORATOIRE
INPOTESCH
INTERNATIONAL

«Лаботорія Інпотекс Інтернаціональ»
Представництво в Україні: 01001, Київ,
вул. М. Житомирська, 6.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.