



Медичні аспекти здоров'я жінки

№ 2 (115)' 2018

Medical aspects
of woman's healthМедицинские аспекты
здоровья женщины

**Тема номера: Особливості хірургічних втручань
та периопераційного забезпечення у хворих акушерсько-
гінекологічного профілю**

ДЕКСА-
(декскетопрофен) **Здоров'я**

**ЗВІЛЬНИСЬ
ВІД БОЛЮ**

- ОПТИМАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ БЕЗПЕКИ – частоту відміни внаслідок тяжких побічних ефектів можна порівняти з плацебо
- ШВИДКИЙ ПОЧАТОК ЗНЕБОЛЮЮЧОЇ ДІЇ (протягом перших 45 хв.)
- МАЄ ТРИВАЛУ ЗНЕБОЛЮЮЧУ ДІЮ (до 8 годин)
- ДОЗВОЛЯЄ ЗНАЧНО СКОРОТИТИ ДОЗУ ОПІАТІВ в післяопераційному періоді (на 35-45%).

розрахунок дозування: 25 мг/мл 5 ампул по 2 мл

СИМПТОМАТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО БОЛЮ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИСОКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

Ефективне та швидке зняття гострого болю середньої та високої інтенсивності

ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я".
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22
Р.П. № UA/15314/01/01 Наказ МОЗ №1166 від 03.11.2016 р.

www.zt.com.ua

Современная профилактика, диагностика
и лечение послеоперационных инфекций
в акушерстве и гинекологии

Передплатний індекс — 95404



Медичні аспекти здоров'я жінки

Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України

Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р.

Періодичність видання — 8 разів на рік

Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar

Національна бібліотека України
імені В.І. Вернадського

Google
scholar

№ 2 [115] 2018

Зміст

ГІНЕКОЛОГІЯ

- Ефективне вирішення проблеми вагінального дискомфорту.....18
- Клінічні аспекти ускладненого перебігу вагітності та ранніх репродуктивних втрат
- І.Б. Вовк, О.В. Трохимович28
- III міждисциплінарний науковий конгрес «Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та неонатології»
- Огляд доповідей
- Профилактика и терапия периоперационной и перипартальной кровопотери: что нового?
- Р.А. Ткаченко.....51
- Разрывы матки во время беременности и родов
- Л.Б. Маркин.....53
- Место транексамовой кислоты в онкогинекологии
- И.И. Лесной.....54

АКУШЕРСТВО

- Геморрой під час вагітності та у післяпологовому періоді: хірургічне або консервативне лікування
- І.Г. Криворучук, Ю.В. Давидова, А.Ю. Ліманська.....36
- Порівняльна оцінка ефективності використання препарату Орзол®-IN для лікування бактеріального вагінозу у жінок з порушеннями репродуктивного здоров'я та передчасними пологами в анамнезі
- С.О. Шурпак, В.І. Пирогова, Н.В. Шурук.....62

СЕКСОЛОГІЯ

- Особенности сексуальной функции женщины во время беременности и в послеродовом периоде
- О.В. Ромашенко13

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

- Современная профилактика, диагностика и лечение послеоперационных инфекций в акушерстве и гинекологии
- Р.А. Ткаченко, В.В. Каминский5
- Сучасний підхід до післяопераційного знеболення в акушерстві та гінекології
- Є.В. Гріжимальський, А.Й. Гарга20
- Патология эндокринной системы с точки зрения репродуктологии
- Обзор конференции33
- Особливості використання сучасного шовного матеріалу при операціях на органах сечостатевої системи
- В.І. Горовий.....39
- Выбор стартовой антибиотикотерапии при лечении инфекций мочевыводящих путей у женщин в зависимости от менопаузального статуса47
- Бессимптомная бактериурия, цистит и пиелонефрит у женщин.
- Рациональная антибиотикотерапия
- Обзор рекомендаций Европейской ассоциации урологии.....58
- Периоперационное ведение пациенток с онкогинекологической патологией
- Рекомендации Общества ERAS.....68

ЗАПИСНА КНИЖКА

- Анонси17, 32, 57
- Дайджести56, 61

флебодія®

600МГ діосмін

Дві проблеми - одне рішення!



Полегшення симптомів лімфовенозної недостатності^{1,2,3}

біль • тяжкість • трофічні розлади

1 таблетка на добу

Флеботонік та ангіопротектор³



Швидке зменшення симптомів геморою^{3,4,5,6}

біль • набряк • кровотеча

3 таблетки на добу

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить діосмін, що відповідає діосміну безводного чистого 600 мг.

Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТС C05C A03.

Показання для застосування.

- Для полегшення симптомів, обумовлених лімфовенозною недостатністю, таких як відчуття тяжкості у нижніх кінцівках, біль, трофічні розлади;
- у комплексному лікуванні загострення геморою;
- як додатковий метод лікування підвищеної ламкості капілярів, порушення мікроциркуляції.

Спосіб застосування та дози. Для перорального застосування. При хронічній лімфовенозній недостатності: 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Тривалість лікування зазначає від показань до застосування та від стадії захворювання. Середня тривалість лікування складає 2 місяці.

При гострому геморої: 2-3 таблетки на день під час прийому їжі протягом 7 днів, у разі необхідності, лікування продовжують по 1 таблетці 1 раз на добу до 1-2 місяців. Якщо після лікування гемороєм залишилися симптоми захворювання, необхідно звернутися до проктолога для корекції лікування. Максимальна добова доза — 1800 мг (3 таблетки).

Противопоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на новітні червону А (Є 124). Препарат зазвичай не рекомендується застосовувати у період годування груддю.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль.

Категорія відпуску. Без рецепта

Регістраційне посвідчення № UA/8590/01/01 Наназ МОЗ України № 649 від 26.07.2013

¹ R. Barbe Etude de la durée d'action du Diovenor avec contrôle par pléthysmographie, Tribune médicale, 1988, n°270, p49-50.

² Cazaubon M. et al. Etude comparative d'acceptabilité, d'efficacité et de tolérance de deux formes galéniques de diosmine 600 mg, dans le traitement des symptômes de la maladie veineuse chronique. Angiologie, 2011, vol.63, n°2.

³ SmPC PhleboDIA 600 mg (diosmin). Im-coated tablet.

⁴ Chauvenet M., Libeskind M. Intérêt de la diosmine d'hémisynthèse dans la poussée hémorroïdaire aiguë. Essai multicentrique randomisé en double insu versus placebo. Rev Fr Gastro-Enterol 1994; 303: 3-8.

⁵ Kecmanovic D. et al — The use of PhleboDIA® in the management of bleeding non-prolapsed haemorrhoids. Acta Chirurgica Iugoslavica 2005, 52, 1, 115-116

⁶ Debien P., Denis J. Traitement des signes fonctionnels de la crise hémorroïdaire aiguë: Essai multicentrique, randomisé, diosmine d'hémisynthèse versus association extrait de Ginkgo biloba-heptaminol-troxeutine. Med Chir Dig 1996; 25 (5): 259-64.

LABORATOIRE
innotech
INTERNATIONAL

«Лабораторія Іннотек Інтернаціональ»
Представництво в Україні: 01001, Київ,
вул. М. Житомирська, 6.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.