



# Медичні аспекти здоров'я жінки

№ 3 (116)' 2018

Medical aspects  
of woman's health

Медицинские аспекты  
здоровья женщины



Гестационный диабет: пути решения  
проблемы на этапе беременности

Ведение пациенток с воспалительными  
заболеваниями органов малого таза

Обзор рекомендаций Британской ассоциации  
сексуального здоровья и ВИЧ

Значение и особенности использования  
метода анкетирования при оценке  
женской сексуальной функции

Новая опция терапии  
гормоночувствительного рака молочной  
железы: результаты исследования  
MONALEESA-3



# Медичні аспекти здоров'я жінки

Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України

Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р.

Періодичність видання — 8 разів на рік

Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar



№ 3 (116) 2018

## Зміст

### АКУШЕРСТВО

Гестационный диабет: пути решения проблемы на этапе беременности

Т.В. Авраменко, И.М. Меллина, Н.И. Владимировна . . . . . 5

Особливості обміну мікроелементів та стану сполучної тканини у першовагітних із порушенням дозрівання шийки матки у другій половині вагітності

О.І. Буткова, І.А. Жабченко, В.Ф. Олешко . . . . . 11

### ГІНЕКОЛОГІЯ

Ведение пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза

Обзор рекомендаций Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ . . . . . 17

Гиперпролиферативная патология женской репродуктивной системы: роль агонистов гонадотропин-рилизинг гормона

Н.В. Косей, С.И. Ререда, А.И. Западенко . . . . . 24

Сучасний погляд на проблему стресового нетримання сечі у жінок

А.С. Шатковська, А.П. Григоренко, О.Г. Горбатюк, А.М. Бінковська, В.Ю. Онишко, О.І. Полунченко, О.Л. Ємельянік . . . . . 50

### СЕКСОЛОГІЯ

Значение и особенности использования метода анкетирования при оценке женской сексуальной функции

О.В. Ромашенко, С.Н. Мельников, А.В. Бабич . . . . . 38

### ОНКОЛОГІЯ

Новая опция терапии гормоночувствительного рака

молочной железы: результаты исследования MONALEESA-3 . . . . . 33

### МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Лазерные методики в косметологии и гинекологии

Интервью с Е.В. Колодченко . . . . . 45

Современная тактика лечения железодефицитной анемии

С.Н. Гайдукова, С.В. Выдыборец . . . . . 56

### ЗАПИСНА КНИЖКА

Анонси . . . . . 16, 32, 54, 55, 65

Дайджест . . . . . 31

# Тотема®

залізо, мідь, марганець

## ФРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ – ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!



- Швидка гематологічна відповідь<sup>1</sup>
- Органічні солі заліза, міді та марганцю<sup>2</sup>
- Можливе застосування під час вагітності<sup>2</sup>
- Дозволено дітям з 1-го місяця<sup>2</sup>
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ<sup>3</sup>



<sup>1</sup> С.В. Селюченко. Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни. «Земский врач». № 1. 2012. стр. 37-42.  
<sup>2</sup> Инструкция для медицинского застосування.  
<sup>3</sup> WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments – October 2013).

**Склад лікарського засобу:** 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді заліза глюконату) 50 мг; марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг; міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг. **Показання для застосування.** Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. **Протипоказання.** Надлишок заліза в організмі. Регулярні гемотрансфузії. Одночасне застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізорефрактерна анемія. Анемія, пов'язана з недостатністю медулярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Спадкова непереносимість фруктози.

**Спосіб застосування та дози.** Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям віком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії.

**Профілактика анемії та залізодефіциту:** для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула) на день протягом другого та третього триместрів вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності.

**Побічні ефекти.** З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, печія, закрп, діарея. Можливе тимчасове забарвлення випорожнення у чорний колір, що не має клінічного значення та ніяких наслідків для здоров'я. Можлива тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести розчин препарату у відповідному напої та під час застосування не тримати його довго у ротовій порожнині. Можливі алергічні реакції (свербіж, висипання, кропив'янка, анафілактична реакція); біль у животі, блювання. Категорія відпуску. Без рецепта.

Ресстраційне посвідчення №UA/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 23.08.2013



Представництво «Лаботорія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.