



Медичні аспекти здоров'я жінки

№ 5 (118)' 2018

Medical aspects
of woman's health

Медицинские аспекты
здоровья женщины



Тематичний випуск: онкологічні захворювання у жінок

Скрининг рака молочной железы у женщин
со средней степенью риска

Обзор практического бюллетеня ACOG

Застосування рибоциклібу разом з гормональною
терапією в лікуванні HR+ розповсюдженого раку
молочної залози

Рандомізоване дослідження MONALEESA-7, фаза 3

Цервикальный скрининг: сравнение значимости
ВПЧ-тестирования и жидкостной цитологии

Профилактика рака посредством модификации
питания: возможно ли невозможное?



Медичні аспекти здоров'я жінки

Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України

Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р.

Періодичність видання — 8 разів на рік

Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar

Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського

Google
scholar

№ 5 (118) 2018

Зміст

ГІНЕКОЛОГІЯ

Особливості застосування комбінованих оральних контрацептивів з контрацептивною та лікувально-профілактичною метою

І.Б. Вовк 24

Цервикальный скрининг: сравнение значимости ВПЧ-тестирования и жидкостной цитологии 32

Перспективный подход к лечению папилломавирусной инфекции И.В. Лахно, В.И. Останина, Е.В. Милютин 37

Анемии при заболеваниях женской репродуктивной системы Н.И. Стуков 42

Особенности заместительной гормональной терапии при преждевременной недостаточности яичников 55

МАМОЛОГІЯ

Модификация рисков патологии молочных желез: как не упустить рак

Клинический междисциплинарный диалог 46

ОНКОЛОГІЯ

Скрининг рака молочной железы у женщин со средней степенью риска

Обзор практического бюллетеня ACOG 10

Застосування рибонуклеаз разом з гормональною терапією в лікуванні HR+ розповсюдженого раку молочної залози

Рандомізоване дослідження MONALEESA-7, фаза 3 15

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Гендерные проблемы старости в контексте гормонального континуума

З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская 5

Обзор методов коррекции в эстетической гинекологии

В.И. Аверина 52

Профилактика рака посредством модификации питания: возможно ли невозможное?

А.Б. Бизунков 60

ЗАПИСНА КНИЖКА

Анонси 2, 36

Інформаційне повідомлення 51

ТОТЕМА®
залізо, мідь, марганець

**ФРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ –
ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!**



- Швидка гематологічна відповідь¹
- Органічні солі заліза, міді та марганцю²
- Можливе застосування під час вагітності²
- Дозволено дітям з 1-го місяця²
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ³



¹ С.В. Селюк. Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни «Земский врач». № 1, 2012, стр. 37-42.
² Инструкция для медицинского застосування.
³ WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments – October 2013).

Склад лікарського засобу: 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді заліза глюконату) 50 мг; марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг; міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг. **Показання для застосування.** Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. **Протипоказання.** Надлишок заліза в організмі. Регулярні гемотранфузії. Одночасне застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізоеритроцитна анемія. Анемія, пов'язана з недостатністю медулярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Спадкова непереносимість фруктози.

Спосіб застосування та дози. Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям віком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії.

Профілактика анемії та залізодефіциту: для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула) на день протягом другого та третього триместрів вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності.

Побічні ефекти. З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, печія, закріп, діарея. Можливе тимчасове забарвлення випорожнень у чорний колір, що не має клінічного значення та ніяких наслідків для здоров'я. Можлива тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести розчин препарату у відповідному напої та під час застосування не тримати його довго у ротовій порожнині. Можливі алергічні реакції (свербіж, висипання, кропив'янка, анафілактична реакція); біль у животі, блювання. Категорія відпуску. Без рецепта.

Регістраційне посвідчення №UA/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 23.08.2013

LABORATOIRE
INNOTECH
INTERNATIONAL

Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернаціональ» в Україні,
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.