

Всесвітньої організації охорони здоров'я, оскільки вона є основою первинної медичної практики [4].

В Сполучених Штатах щороку реєструється понад 1 мільйон нових випадків інсульту, з яких 80-85% є повторними інсультами. Риск повторного інсульту в перші 90 днів після першого інсульту становить 5-15%.

В Україні щороку реєструється понад 1 мільйон нових випадків інсульту, з яких 80-85% є повторними інсультами. Риск повторного інсульту в перші 90 днів після першого інсульту становить 5-15%.

НЕВРОЛОГІЯ • ОГЛЯД

№ 5 (126)
2021

НЕЙРО

NEWS

Expert View of astle.



психоневрологія та нейропсихіатрія



Шановні колеги!

Протягом останніх років у рубриці «Клінічний випадок» ми публікували численні описи з практики неврологів, психіатрів та психотерапевтів.

Аналіз реальних клінічних випадків можна вважати найціннішим здобутком у медичній літературі, оскільки саме вони дають змогу правильно екстраполювати наукові теорії, рекомендації та дані досліджень на конкретні клінічні ситуації.

Презентація та обговорення складних, нестандартних клінічних випадків допомагають фахівцям не лише підтверджувати здобуті знання й навички їхнього практичного застосування, а й розвиватися у професійній сфері, збагачуючи власний досвід надбаннями колег.

Наразі пропонуємо до вашої уваги черговий випуск підбірки клінічних випадків у неврології та психіатрії, які не залишать байдужими як досвідчених лікарів, так і тих, хто лише розпочинає свій професійний шлях.

Від імені колективу редакції журналу «НейроNEWS» щиро дякую нашим авторам, які діляться корисною інформацією на сторінках нашого видання. Сподіваємось на подальшу тісну співпрацю і чекаємо на нові клінічні випадки з вашої практики.

*З повагою
шеф-редактор журналу
Летяна Ільницька*

НЕЙРО NEWS[®]

ЗМІСТ

Енцефалопатії з розладами загального розвитку (розладами аутистичного спектра), епілептичними нападами і психотичними симптомами <i>Т.О. Скрипник, Г.В. Макаренко, І.А. Марценковський</i>	6
Педіатричний делірій: клінічний та генетичний поліморфізм і можливий зв'язок з іншими психічними розладами <i>Г.В. Макаренко, І.А. Марценковський</i>	12
Синдром кільцевої 14-ї хромосоми <i>В.І. Харитонов, Д.А. Шпаченко, Т.І. Бочарова</i>	16
Бічний амиотрофічний склероз <i>Ю.О. Сухоручкін</i>	20
COVID-19 і синдром Гієна-Барре: можливі механізми взаємозв'язку	24
Лобно-скронева лобарна дегенерація <i>Ю.О. Сухоручкін</i>	27
Магнітно-резонансна томографія при діагностуванні хвороби Альцгеймера <i>Ю.О. Сухоручкін</i>	31
Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія <i>Ю.О. Сухоручкін</i>	35
Тривога та розлади харчової поведінки <i>Орос М.М., Грабар В.В.</i>	39
Альтернативний фармакотерапевтичний підхід до лікування пацієнтів із кататонічною шизофренією	46
Настанови щодо лікування епілепсії у дорослих і педіатричних пацієнтів	49
Спінальна м'язова атрофія з пізнім початком	59
Дослідження перебігу COVID-19 у пацієнтів із розсіяним склерозом на тлі терапії окрелізумабом	62
Застосування тівортину (I-аргініну) в ранньому відновному періоді у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом <i>І.В. Хубетова, О.О. Колесник, О.І. Ісайкова, О.В. Величко, А.О. Саламаха, І.З. Федорович, І.В. Ревенюк, О.Ю. Малютенко</i>	67
Сучасні можливості терапії протиепілептичними препаратами	70

