

ОСТРЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ в практике врача®

5 2015

- Протокол массивной трансфузии при огнестрельной травме
- Вакуум-терапия в лечении обширных огнестрельных ран конечностей

Расширенный спектр действия на Вашей стороне^{1,2,3}

Тигацил
тайгециклин

- ✓ Грамотрицательные
- ✓ Грамположительные
- ✓ Анаэробы
- ✓ Резистентные Грамотрицательные
- ✓ Резистентные Грамположительные

ТИГАЦИЛ (тайгециклин) обладает *in vitro* активностью против широкого спектра патогенов¹

¹ Тигацил, Инструкция для медицинского применения препарата, PZ-M3 Украина UA12347/01/01 от 26.07.2012.
² Wilcox M.H. Ticaglicline and the need for a new broad-spectrum antibiotic class. *Surg Infect* (Lancet). 2006; 7:69-74.
³ Baruchak T, Ellis-Crowe E, Davidson N et al. The Efficacy and Safety of Ticaglicline for the Treatment of Complicated Intra-Abdominal Infections: Analysis of Pooled Clinical Trial Data. *Clinical Infectious Diseases*. 2008;41(suppl 5):S45-S567.

ТИГАЦИЛ (тайгециклин) по 50 мг в стеклянном флаконе, закрытый пробкой, по 10 флаконов в коробке из картона.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА.

Показания к применению. Осложненные инфекции кожи и мягких тканей за исключением инфекций диабетической стопы. Осложненные инфекции брюшной полости. **Противопоказания.** Гиперчувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата, а также к другим препаратам тетрациклинового ряда. **Способ применения и дозы.** Начальная рекомендуемая доза составляет 100 мг, а дальнейшие приемлет по 50 мг каждые 12 часов в течение 5-14 дней. Продолжительность лечения должна зависеть от тяжести заболевания, локализации инфекции и клинического ответа больного. Тигацил вводят внутривенно в течение 30-60 мин. Приготовленный раствор следует использовать немедленно. **Побочные реакции.** Частое (до 10%) наблюдаются такие преходящие побочные реакции, как тошнота (20%) и рвота (14%), абсцессы, инфекции, пневмония, удлинение антимикробного действия препарата, удлинение протромбинного времени (ПТВ), гипотензия, головкружение, фибриллы, диарея, боль в животе, диспепсия, анорексия, повышение уровня АсАт, АлаАт, гипербилирубинемия, зуд, сыпь, головная боль, повышение уровня аминотрансфераз, азот мочевины в крови, гемолитический криз. **Особенности применения.** Пациентам с нарушением функции почек и пациентам, находящимся на гемодиализе, пациентам с легкими или умеренными нарушениями почек, пациентам пожилого возраста коррекция дозы не нужна. Для контроля за состоянием пациента, который применяет тигацил вместе с антикоагулянтами, следует использовать тест для определения ПТВ или другой подобный тест для определения параметров коагуляции. Не рекомендуется использовать Тигацил детям. Тайгециклин не следует применять беременным, кроме случаев крайней необходимости, когда польза для матери превышает риск для плода/ребенка. При применении Тигацила у женщин, кормящих грудью, следует проявлять осторожность и оценить возможность прекращения кормления грудью грудью ребенка. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** При одновременном применении тайгецикла с антикоагулянтами следует тщательно контролировать состояние пациентов, используя соответствующие тесты для определения коагуляции. Вальпроат не влияет на фармакокинетический профиль тайгецикла. Ожидается, что на клинические эффекты тайгецикла не влияют ингибиторы или индукторы изоферм CYP450. При одновременном применении тайгецикла с диализом нет необходимости в коррекции дозы. При исследовании тайгецикла не выявлено антагонизма между тайгециклин и антибиотиками других классов, которые часто применяют в терапии. Одновременное применение антибиотиков с пероральными контрацептивами может снизить эффективность контрацептивов. Нельзя вводить одновременно с Тигацилом через один и тот же Y-образный катетер: амфотерицин В, лидарин, катетер: амфотерицин В, диализат, эзометазол, омепразол и растворы для внутривенного введения, которые могут привести к увеличению значения pH более 7. Тигацил не следует смешивать с другими лекарственными средствами, для которых не была доказана совместимость с тайгециклин. **Фармакологические свойства.** Тайгециклин - антибиотик тетрациклинового ряда, ингибирует транскрипцию белка в бактериях путем блокирования рибосомной субъединицы 30S и блокирует встраивание аминокислот в сайт А рибосомы, что препятствует включению аминокислотных остатков в нарастающие пептидные цепи. В целом, считается, что тайгециклин прерывает белоксинтезное действие. **Категория отпуска.** По рецепту.

Перед использованием препарата необходимо ознакомиться с полной инструкцией по применению. Информацию для врачей и фармацевтов. Предназначено для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике. Регистрационное свидетельство МЗ Украины UA12347/01/01 от 26.07.2012.

За дополнительной информацией обращайтесь в Представительство "Pfizer H.C.P. Corporation" в Украине: 03680, г. Киев, ул. Н. Амосова, 12 тел. (044) 291-60-50



АЛГОРИТМЫ

Опыт работы службы лечения острой и хронической боли в многопрофильном

стационаре

С.А. Рыженко, Ю.Ю. Кобыляцкий, А.Н. Толубаев, А.М. Машин, В.А. Толубничий, Р.К. Карась.....5

БОЕВАЯ ТРАВМА

Протокол массивной трансфузии при огнестрельной травме: данные литературы,

собственный опыт и проблемные вопросы

И.А. Иовенко, Ю.Ю. Кобыляцкий, А.В. Царев, О.В. Белочерковцев, Е.А. Кузьмова, В.В. Петров.....7

Оптимизация надання нейрохірургічної допомоги при вогнепальних пораненнях черепа

та головного мозку

А.Т. Сірко, Л.А. Дзюк.....19

Вакуум-терапия в лечении обширных огнестрельных ран конечностей

И.И. Жердев, А.М. Горезяко, П.И. Давиденко, А.С. Васильев.....25

Особенности анаэробной инфекции, ассоциированной с боевой травмой

Л.А. Мамычева, Н.Ф. Мосенцев, В.Н. Лисничая.....28

Досвід лікування вогнепальних ушкоджень м'яких тканин та м'ястравельних судин

на етапах евакуації

О.Б. Кутюков, О.О. Сергеев, С.О. Косыльников, О.В. Соколов.....31

Неотложные состояния в отоларингологии

Д.В. Лысенко, А.К. Морзачева, И.А. Литвин.....34

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

Досвід застосування опіоїдного анальгетика набуфіна (Набулук) для післяопераційного

знеболювання оперативних втручань з приводу пухлин черевної порожнини

Д.В. Дымитриев, О.О. Катинчук, Л.Л. Остапенко.....35

КАРДИОЛОГИЯ

Клініко-діагностичні аспекти гострих міокардітів у військовослужбовців – учасників

бойових дій

С.М. Смага, І.З. Куценко, Б.С. Порошко.....40

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Применение вазоконстрикторов при пищеводно-желудочных кровотечениях

М.В. Перевитин, П.А. Завченко.....45

АКАДЕМИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

Класифікація розчинів для інфузійної терапії: традиційні погляди та сучасні тенденції

О.А. Галушко, С.М. Недашківський, Д.О. Дзюба.....49

Грип: клініка, діагностика та інтенсивна терапія

І.П. Шляпак, О.А. Голубовська, О.А. Галушко.....53


АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ

Левовфлоксацин для инфузий в современной терапии инфекционно-воспалительных

заболеваний

Л.А. Воронская.....63

Пам'яті Ігоря Порфирійовича Шляпака.....70



Рациональная фармакотерапия

96488

<http://rph.com.ua>



Практична ангіологія

94976

<http://angio.health-ua.com>



Острые состояния и неотложные в практике врача

95403


<http://emergency.health-ua.com>



Медицинские аспекты

95404

<http://mazg.com.ua>




Медицинские аспекты

здоровья мужчин

89519

www.mazg.com.ua



Дитячий лікар

37812

<http://d-l.com.ua>




Клінічна

імунологія, інфектологія

94977

<http://kial.com.ua>



Нейро News: психоневрологія і нейропсихіатрія

96489

<http://neuro.health-ua.co>