

ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ у практиці лікаря®

urgent.com.ua

- Гострий коронарний синдром, ускладнений ішемічним пошкодженням головного мозку
- Утоплення: сучасні підходи з позицій доказової медицини



Тигацил

для лікування дорослих та дітей від 8 років

ТИГАЦИЛ (тайгециклін)
має активність проти
широкого спектра
патогенів

- Грамнегативні організми
- Граммпозитивні організми
- Анаероби

- Резистентні грамнегативні організми
- Резистентні грампозитивні організми

ТИГАЦИЛ (тайгециклін) по 50 мг у скляному флаконі, застосування: по 10 флаконів у пацієнта картону.

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ.


Показання до застосування. Тигацил застосовується дорослим та дітям віком від 8 років для лікування таких інфекцій: ускладнених інфекцій шкіри та м'яких тканин, за винятком інфекцій діабетичної стопи; ускладнених інфекцій черевної порожнини. Тигацил слід застосовувати тільки у випадках, коли інші антибіотики не прийнятні до застосування. Слід звернути увагу на офіційні рекомендації щодо відповідного застосування антибактеріальних засобів. **Протипоказання.** Гіперчутливість до активної речовини чи до будь-якої з допоміжних речовин препарату, а також до інших препаратів тетрациклінового ряду. Пацієнти, які мають гіперчутливість до антибіотиків тетрациклінового ряду, можуть мати гіперчутливість до тайгецикліну. **Спосіб застосування та дози.** Початкова рекомендована доза для дорослих становить 100 мг, надалі застосовувати по 50 мг кожні 12 годин протягом 5-14 днів. Тривалість лікування повинна залежати від тяжкості захворювання, локалізації інфекції та клінічної відповіді хворого. Тигацил вводять внутрішньовенно протягом 30-60 хв. Приготований розчин слід використати негайно. Для вагітних від 8 до 12 років 1,2 мг/кг тайгецикліну від тяжкості захворювання, локалізації інфекції та клінічної відповіді хворого. Тигацил вводять внутрішньовенно протягом 30-60 хв. Приготований розчин слід використати негайно. Для вагітних від 8 до 12 років 1,2 мг/кг тайгецикліну кожні 12 годин внутрішньовенно, максимальна доза – 50 мг кожні 12 годин протягом 5-14 днів. Для вагітних від 12 до 18 років: 50 мг кожні 12 годин протягом 5-14 днів. Для вагітних від 18 років: 50 мг кожні 12 годин протягом 5-14 днів. **Більш детально див. інструкцію.** **Побічні реакції.** Найчастіше реакції у місці ін'єкції, підвищення рівня алілази, азоту сечовини в крові, посивання слизових оболонок. **Особливості застосування.** Хворим із порушенням функції нирок та пацієнтам, які заходяться на гемодіаліз, пацієнтам з легким чи помірним ураженням печінки, пацієнтам похилого віку корекція дози не потрібна. Для контролю за станом пацієнта, ким застосовується тайгециклін разом з антикоагулянтами, слід виконувати тест для вивчення ПТВ4 або інший подібний тест для вивчення коагуляції. **Безпечність та ефективність препарату Тигацил у дітей віком від 8 до 18 років не встановлені.** Тайгециклін не слід застосовувати вагітним, окрім випадків крайньої необхідності, коли користь для матері перевищує ризик для плода/дитини. При застосуванні Тигацилу жінкам, які годують груддю, слід виконувати обережність і оцінити можливість припинення годування грудним молоком. При керуванні автомобілем та роботі з технікою необхідно врахувати можливість виникнення запаморочення при застосуванні тайгецикліну. **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** При одночасному застосуванні тайгецикліну з антикоагулянтами слід ретельно контролювати стан пацієнта, використовувати відповідні тести для визначення коагуляції. Цифрадрин не впливає на фармакокінетичний профіль тайгецикліну. Очікується, що на кірени тайгецикліну не впливатимуть інгібітори чи індуктори цитохрому CYP450. При одночасному застосуванні тайгецикліну з дисперсним немає потреби в корекції дози. При дослідженні в vitro не було виявлено антагонізму між тайгецикліном та антибіотиками інших класів, які часто застосовують у терапії. Супутнє застосування антибіотиків з оральними протизапальними засобами може знизити ефективність протизапальних засобів. Не можна вводити одночасно з Тигацилом через одні й той самий Y-подібний катетер: амфотерицин В, ліпідний комплекс амфотерицину В, діазепам, везамідрол, омепразол та речовини для внутрішньовенного введення, які можуть призвести до збільшення значення рН понад 7. Тигацил не слід змішувати з іншими лікарськими засобами для яких не була доведена сумісність з тайгецикліном. **Фармакологічні властивості.** Тайгециклін – антибіотик спіроциклінового ряду, який небує трансміцією білої у бактерії шляхом приєднання до рибосомної субодиниці 30S та блокування входу молекули аміно-ацил-тРНК в сайт А рибосоми, що перешкоджає включенню амінокислотних залишків у наростаючу пептидну ланцюг. Загальною властивістю, що тайгецикліну притаманна бактеріостатична дія. Категорія відпуску: За рецептом. **Перед використанням препарату необхідно ознайомитися з інструкцією для застосування. Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Реєстраційне посвідчення МОЗ України UA12347/01/01 від 26.07.2012. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 12.05.2016 № 436.**



За додатковою інформацією звертайтеся
у Представництво «Файзер Ейч. Сі. Пі. Корпорейшн» в Україні:
03680, м. Київ, вул. Амосова, 12. Тел. (044) 391-60-50.
WUKTYG0217033

Більше інформації Ви знайдете
на медичному порталі для професіоналів
www.pfizermed.com.ua





Шановні читачі!

Завітайте на наш оновлений сайт. Ми сподіваємося, що кращий дизайн та вдосконалена функціональність сайту зроблять перебування на електронному ресурсі нашого видання ще приємнішим!



У оновленій версії сайту Ви знайдете:

- більш зручний пошук матеріалів, можливість сортувати їх за розділами, темами тощо;
- україномовну, російськомовну та англomовну версії видання;
- корисні посилання на авторитетні для лікарів ресурси;
- анонси найцікавіших науково-практичних заходів, присвячених гострим та невідкладним станам



ГОСТРИ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ
у практиці лікаря

<http://urgent.com.ua/>

ЗМІСТ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПРОБЛЕМА

Гострий коронарний синдром, ускладнений ішемічним пошкодженням головного мозку

С.М. Стаднік, В.В. Куценко, С.В. Павлишин.....5

Стан когнітивних функцій у пацієнтів із брадиаритміями і постійною електрокардіостимуляцією

С.М. Стаднік.....10

РЕАНІМАТОЛОГІЯ

Утоплення: сучасні підходи з позицій доказової медицини

І.В. Кисельова, В.В. Петриченко, А.М. Богдан, А.Й. Гарга, О.А. Галушко16

АКАДЕМІЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

Міжнародні рекомендації з моніторингу пацієнтів під час проведення інфузійної терапії

С.М. Недашківський, О.А. Галушко, Т.М. Базь.....24

Холера: особливості перебігу та інтенсивної терапії

Д.О. Дзюба, О.А. Галушко, А.С. Крилова30

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

Ведення дорослих пацієнтів із нозокоміальною і вентилятор-асоційованою пневмонією: питання і відповіді

Рекомендації Американського товариства із вивчення інфекційних захворювань та Американського торакального товариства37

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Травма органів грудної клітки – пневмоторакс

Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги48

ОРТОПЕДІЯ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Особенности течения анкилозирующего спондилоартрита в современных условиях

Е.А. Якименко, Л.В. Закатова, Н.Н. Антипова, В.В. Тбилели, В.В. Василец60

ТВОРЧИСТЬ НАШИХ АВТОРІВ

Делирий (лекція в стихах)

М.В. Бондар.....63