

ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ

у практиці лікаря®

urgent.com.ua

- Декомпенсація цукрового діабету у хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу
- Порушення водно-електролітного балансу та їх корекція

ЮРІЯ-ФАРМ

**ЦІННІСТЬ ВИЩА
ЗА ВАРТІСТЬ**

**ВОЛЮТЕНЗ®
ГЕКОТОН®
ГЕКОДЕЗ®**



**ІННОВАЦІЙНІ ПЛАЗМОЗАМІННИКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ВІД «ЮРІЯ-ФАРМ»**

Інформація про рецептурний лікарський засіб для професійної діяльності спеціалістів в галузі охорони здоров'я

ГЕКОТОН® Ресурсне посвідчення № UA/13224/01/01. Фармакотерапевтична група. Кровозамінники та перфузійні розчини. Препарати гідроксіетилкрахмалу. Код АТХ B05A A07. Склад: діючі речовини: 100 мл розчину містить гідроксіетилкрахмалу 130/04 5/0 г, калію лактату 1,5 г, натрію хлориду 0,8 г, калію хлориду 0,02 г, натрію хлориду 0,01 г; Показання. Профілактика та лікування гіповолемії та шоку наслідком хірургічних втручань, інфекційних захворювань, травм та опіків; терапевтичне розведення крові (гемоділіція) з лікувальною метою. Протипоказання. Падіння чутливості до діючих речовин (у т.ч. алергія на крохмаль), стан гіпергідратації, гіперволемія, ниркова недостатність, що супроводжується отруєнням або інтубацією (креатинін ≥ 177 ммоль/л), гіперосмолярна кома, гіпернатріємія (натрійний іон), холангіти, тяжка гіпокоагуляція, гіпофібриногенемія, виражена тромбоцитопенія, період проведення сеансів гемоділізації. ГЕКОТОН® не слід вводити у випадках, коли протипоказано вживання рідини (набряки, внутрішньочерепні крововиливи, гіпертонічна хвороба III ст.). Особливу обережність рекомендується проявляти стосовно пацієнтів з набряком легень, серцево-судинною декомпенсацією, тяжкими хронічними захворюваннями печінки, дегідратацією (в цьому випадку рекомендується провести заміщення рідини кристалідами). Спосіб застосування та дози. Препарат вводять внутрішньовенно краплинно. Максимальна добова доза (у виняткових випадках допускається перевищення) – 20 мл/кг/добу (1400-1600 мл на добу).

ГЕКОДЕЗ® Ресурсне посвідчення № UA/1672/01/01. Фармакотерапевтична група. Кровозамінники і перфузійні розчини. Препарати гідроксіетилкрахмалу. Код АТХ B05A A07. Склад: діючі речовини: гідроксіетилкрахмаль; 1 мл розчину містить гідроксіетилкрахмалу із середньою молекулярною масою 200000 і середнім молекулярним замінником 0,5 (гідроксіетилкрахмаль (200/0,5)) – 60 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Показання. Гіповолемія, спричинена гострим кровотвором, у випадках, коли застосування тільки кристаліди вважається недостатнім. Протипоказання. Гіперуявність до складових препарату, гіпергідратація, гіперволемія, виражена гіпернатріємія, хронічна серцева недостатність, тяжкі порушення системи згортання крові, тяжка гіперхлоремія, внутрішньочерепний або церебральний крововилив, виражена печінкова недостатність, стан дегідратації, коли потрібна корекція водно-електролітного балансу, виявлення сенситивності до ГЕК, ниркова недостатність чи заміна ниркової терапії, тяжка коагулопатія. Набряк легень. Препарат протипоказаний пацієнтам із сепсисом, опіками, із трансплантованими органами та критично хворим пацієнтам через ризик ураження нирок та легального кисцю. Добова доза і швидкість введення розчину залежать від об'єму кровотрати, необхідності підтримки або відновлення гемодинамічних параметрів. Максимальна добова доза ГЕКОДЕЗ® не повинна перевищувати 50 мл/кг маси тіла, що відповідає 3 г ГЕК/кг/добу (біла 3500 мл/добу при масі тіла пацієнта 70 кг).

ВОЛЮТЕНЗ® Ресурсне посвідчення № UA 13338/01/01. Фармакотерапевтична група. Кровозамінники і перфузійні розчини. Препарати желатину. Код АТХ B05A A06. Показання. Профілактика і лікування відносної або абсолютної гіповолемії або шоку. Профілактика артеріальної гіпотензії (у тому числі при індукованій епідуранальною або спинальною анестезією). Процесури, що включають екстракорпоральний кровообіг (у тому числі на апараті «серце та легені») остра нормоволемічна гемоділізія. Протипоказання. Падіння чутливості до будь-якого компонента препарату. Гіпергідратація. Гіперволемія. Тяжка серцева недостатність. Тяжка ниркова недостатність. Нещодавно перенесений інфаркт міокарда. Тяжкі порушення згортання крові. Гіпернатріємія. Гіперкаліємія. Дегідратація. Максимальна доза 3 токсикологічної точки зору обмежує дози немає. Максимальна добова доза визначається ступенем гемоділізі. Слід дотримуватися обережності, щоб уникнути зниження гематокриту нижче критичних значень. Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. ТОВ «Юрія-Фарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Вербоногова, 108. Тел./факс: (044) 281-01-01.

ЮРІЯ-ФАРМ




Передплатний індекс 95403

urgent.com.ua



Шановні читачі!

Завітайте на наш оновлений сайт. Ми сподіваємося, що кращий дизайн та вдосконалена функціональність сайту зроблять перебування на електронному ресурсі нашого видання ще приємнішим!



У оновленій версії сайту Ви знайдете:

- більш зручний пошук матеріалів, можливість сортувати їх за розділами, темами тощо;
- україномовну, російськомовну та англomовну версії видання;
- корисні посилання на авторитетні для лікарів ресурси;
- анонси найцікавіших науково-практичних заходів, присвячених гострим та невідкладним станам

ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ
СТАНИ
у практиці лікаря



ЗМІСТ

КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ

Декомпенсація цукрового діабету у хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу

О.А. Галушко.....5

ІНФЕКТОЛОГІЯ

Діагностика й лікування госпітальної пневмонії: практичний підхід.....11

АКАДЕМІЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

Порушення водно-електролітного балансу та їх корекція.

Частина 1. Корекція порушень обміну натрію

Д.О. Дзюба, А.Б. Диня, І.А. Гаан, О.А. Галушко.....17

Алкогольний делірій

С.М. Недашківський, А.М. Богдан, Н.А. Кренбі, О.А. Галушко.....22

ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ

Актуальні питання застосування антибіотиків при перитоніті.....27

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

Ведення пацієнтів із бронхіальною астмою

Керівництво Шотландської міжколегіальної мережі із розробки

клінічних рекомендацій (SIGN).....33