

№ 3 (70)
2015

Практична ангіологія[®]

➔ Стандарти медичинської допомоги
при сахарному діабеті (ADA, 2015)

ЛАНТУС[®]
інсулін гларгін

№ 1

ТОМУ
ЩО ДОВІРЯЮ

ІНСУЛІН № 1 у світі¹

ПОНАД 10 РОКІВ доведеної
ефективності та вивченої безпеки²⁻⁷

10 РОКІВ успішного застосування
В УКРАЇНІ⁸



КЛІНІЧНО ДОВЕДЕНО. ДЛЯ ВАС І ВАШИХ ПАЦІЄНТІВ.

Інструкція для медичного застосування препарату ЛАНТУС[®] СолоСтар[®] (LANTUS[®] SoloStar[®]). Наказ МОЗ України № 373 від 23.05.2012, зі змінами від 19.05.2015, наказ МОЗ України № 291. Реєстраційне посвідчення в Україні № UA/8106/01/01. Зміни затверджені наказом МОЗ України № 396 від 18.05.2013. Вкладка до РП від 18.05.2013, наказ МОЗ України № 396. Вкладка до РП від 19.12.2014, наказ МОЗ України № 978.

Інформація про препарат Лантус[®] СолоСтар[®].

Склад*. Активна речовина: інсулін гларгін; 1 мл розчину для ін'єкцій містить 3,6378 мг інсуліну гларгіну, що еквівалентно 100 Од. інсуліну гларгіну.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Інсуліни та аналоги тривалої дії для ін'єкцій. Код АТС A10AE04.

Фармакологічні властивості*. Інсулін гларгін розроблений як аналог інсуліну, у тому числі інсуліну людини, який має низьку розчинність у нейтральному середовищі. Найважливішою дією інсуліну, у тому числі інсуліну гларгіну, є регуляція метаболізму глюкози. Інсулін та його аналоги знижують рівень глюкози у крові за рахунок стимуляції його споживання периферичними тканинами, зокрема скелетними м'язами та жировою тканиною, а також посилюючи пригнічення утворення глюкози у печінці. Інсулін пригнічує ліполіз в адипоцитах та протеоліз, одночасно посилюючи синтез білка.

Показання. Цукровий діабет, що потребує лікування інсуліном, у дорослих, підлітків і дітей, старших за два роки.

Протипоказання. Підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої допоміжної речовини, що входить до складу препарату.

Спосіб застосування та дози*. Препарат вводять один раз на день у будь-який час доби, але щоразу в один і той самий час. Режим дозування препарату Лантус[®] СолоСтар[®] (доза та час введення) слід підбирати індивідуально. Лантус[®] СолоСтар[®] слід вводити підшкірно. Лантус[®] СолоСтар[®] не можна вводити внутрішньовенно. Сила дії виражається в одиницях, ці одиниці застосовуються винятково для препарату Лантус[®] СолоСтар[®] і відрізняються від МО чи одиниць, у яких виражається сила дії інших аналогів інсуліну.

Побічні реакції*. Гіпоглікемія, як правило, є найчастішою побічною реакцією, що спостерігається під час інсулінотерапії. Метаболічні та аліментарні розлади. Дуже часто ($\geq 1/10$): гіпоглікемія. Розлади з боку шкіри та підшкірних тканин. Часто ($\geq 1/100$ – $<1/10$): ліпогіпертрофія. Нечасто ($\geq 1/1000$ – $<1/100$): ліпоатрофія. Порушення загального стану та реакції у місці введення. Часто ($\geq 1/100$ – $<1/10$): реакції у місці ін'єкційного введення препарату. Рідко ($\geq 1/1000$ – $<1/100$): набряк. Розлади з боку імунної системи. Рідко ($\geq 1/1000$ – $<1/100$): алергічні реакції. Розлади з боку органів зору. Рідко ($\geq 1/1000$ – $<1/100$): порушення зору. Ретинопатія.

Упаковка*. № 5: по 3 мл у картриджі, вмонтованому в одноразову шприц-ручку (без голки для ін'єкцій); по 5 шприц-ручок у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

ТОВ «Санofi-Авентіс Україна».
Київ, 01033, вул. Жиланська, 48-50а,
тел.: +380 (44) 354 20 00, факс: +380 (44) 354 20 01.
www.sanofi.ua



* Інформація подана у скороченому вигляді.
Перед застосуванням ознайомтеся з повною інструкцією для медичного застосування препарату. Інформація для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ, лікарів та фармацевтичних працівників, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики виключно для фахівців охорони здоров'я.

1. Дані IMS Q2 2012. 2. Gerstein H. C. et al. Diabet Med 2006; 23:736-42. 3. Rosenstock J. et al. Diabetes Care 2006; 29:554-9. 4. Aschner P. et al. Lancet 2012; 379:2262-9. 5. Yki-Jarvinen H. et al. Diabetologia 2006; 49:442-51. 6. Riddle M. C. et al. Diabetes Care 2003; 26:3080-6. 7. Schreiber S.A. et al. Diabetes Technol Ther 2008; 10:121-7. 8. Ларин А. С., Юзвенко Т. Ю., Клиническая эндокринология и эндокринная хирургия. — 2013, № 4. — С. 1-9.

SANOFI DIABETES

ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Стандарты медицинской помощи
при сахарном диабете (ADA, 2015)..... 5

Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца
по ведению пациентов среднего и пожилого возраста
с врожденными пороками сердца 2015 18
Н.Т. Ватулин, А.С. Смирнова, Е.В. Ещенко, В.С. Колесников,
Ю.П. Гриценко, Е.В. Картамышева, А.Э. Дегтярева, В.А. Карапыш,
И.А. Перуева, Е.С. Глинская, А.А. Тараторина

Правильность выбора инсулина, времени
для начала терапии и дозировки у больных СД 2-го типа..... 44

Ведение пациентов с хронической болезнью почек
и острым коронарным синдромом.
Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца 2015. 49
Н.Т. Ватулин, А.С. Смирнова, М.И. Зинкович, В.С. Колесников,
Ю.П. Гриценко, Е.В. Дзюба, А.Э. Дегтярева,
О.И. Лагуненкова, Е.В. Ещенко

Оптимизация лечения больных хронической
сердечной недостаточностью в сочетании с хроническим
обструктивным заболеванием легких 57
А.Н. Беловол, И.И. Князькова, А.И. Цыганков, И.А. Толкачева,
О.В. Гребенюк, И.Ю. Плиева

Первичный гиперальдостеронизм под маской
резистентной эссенциальной гипертензии:
редкое заболевание или редкий диагноз? 64
А.С. Коротин, О.М. Посненкова, А.Р. Киселев, О.В. Шевченко,
Ю.В. Попова, Е.Н. Генкал

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Эффективность и безопасность комбинированной терапии
с применением высоких доз лозартана и гидрохлоротиазида
у пациентов с артериальной гипертензией 29

Роль ацетилсалициловой кислоты у профилактики
серцево-сосудистых заболеваний 36

ПРАКТИКУМ

Перспективы использования L-аргинина у пациентов
с сахарным диабетом или высоким риском его развития. 41

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Анонсы..... 35, 56, 63
Дайджест 17, 28, 69



Рациональная
фармакотерапия
96488
<http://rpht.com.ua>



Нейро News:
психоневрология
и нейропсихиатрия
96489
<http://neuro.health-ua.com>



Практична
ангіологія
94976
<http://angio.health-ua.com>





Клінічна
імунологія.
Алергологія.
Інфектологія
94977
<http://kiai.com.ua>

Острые
и неотложные
состояния
в практике врача
95403
<http://emergency.health-ua.com>



Дитячий лікар
37812
<http://d-l.com.ua>

Медицинские
аспекты
здоровья женщины
95404
<http://mazg.com.ua>



Медицинские
аспекты
здоровья мужчины
89519
www.mazm.com.ua