

РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Reproductive Endocrinology
scientific and practical medical journal

ТЕВА

АЛАКТИН

- ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ¹
- ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ/УГНЕТЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕРОДОВОЙ ЛАКТАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПРИЧИНАМ²
- ЕВРОПЕЙСКИЙ КАБЕРГОЛИН, ОДОБРЕН FDA ДЛЯ ПРОДАЖИ В США²



Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в гинекологии. Ингибиторы пролактина. Код АТХ G02C B03.

Показания
Предотвращение/угнетение физиологической послеродовой лактации по медицинским причинам. Гиперпролактинемия. Пролактинсекретирующие аденомы гипофиза. Идиопатическая гиперпролактинемия.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к кабегролину, другим алкалоидной спорыньи или к любому компоненту препарата. Признаки поражения клапанов сердца, определенные с помощью эхокардиографии. Послеродовые адренальные гиперплазия или недостаточность. Злокачественная гипертензия. Преэклампсия, эклампсия. Психоз в анамнезе или риск развития послеродового психоза. Состояния в анамнезе с легочных, перикардальных, ретроперикардальных фиброзных заболеваний.

Побочные реакции
Побочные эффекты дозозависимы и могут уменьшаться при постепенном снижении дозы. Чаще всего встречаются такие побочные эффекты, как снижение артериального давления, головная боль, тошнота, боль. Полный перечень побочных реакций – в инструкции для медицинского применения.

¹ Инструкция препарата Алактин
² <http://www.accessdata.fda.gov>


Схема приема для предотвращения физиологической лактации



Схема приема для угнетения существующей лактации



Схема приема для лечения гиперпролактинемии



Информация о лекарственном препарате. Характеристика и лечебные свойства лекарственного средства. Полная информация о применении препарата и полный перечень побочных реакций содержится в инструкции по медицинскому применению. Информация предназначена для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников, для размещения в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских учреждений и врачей. Утверждено: декабрь, 2013

ТЕВА

ООО «Тева Украина»
01042, Киев, бульв. Дружбы народов, 19, 5-й этаж
Тел.: +38 (044) 594 70 80
www.teva.ua

Р.с. № UA9555/15/01 от 21.04.09

11

ТРИЛИСТ

www.reproduct-endo.com.ua

ОБЗОР

- Физиология гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы и ее связь с другими эндокринными железами**
Ю.А. Дубоссарская, З.М. Дубоссарская 7

- Регуляция эстрогенами ремоделирования костной ткани**
В.В. Поворозняк, Н.А. Резниченко, Э.А. Майлян 14

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ

- Некоторые аспекты диагностики и лечения железодефицитных состояний в практической деятельности на современном этапе**
А.Л. Тихомиров, С.И. Сарсания, Е.В. Ночевкин 20

МЕНЕДЖМЕНТ КЛИМАКТЕРИЯ

- Оценка эффективности и безопасности длительного применения экстракта *cimicifuga racemosa* в терапии больных с климактерическим синдромом**
И.В. Рафаэлян, В.Е. Балан, И.У. Юсупова и др. 38

- Використання селективних модуляторів естрогенних рецепторів у лікуванні клімактеричного синдрому**
О.В. Кравченко 61

ОПУХОЛИ И ПРЕДОПУХОЛЕВАЯ ПАТОЛОГИЯ

- Улипристала ацетат в симптоматическом лечении миомы матки и связанной с миомой гиперменореи**
T. Rabe et al. 45

КОНТРАЦЕПЦИЯ

- Механизм действия левоноргестрела как препарата для экстренной контрацепции**
Департамент гинекологических и репродуктивных наук, Италия 64

АКУШЕРСТВО

- Новые подходы к профилактике и ведению преждевременных родов**
О.Ф. Серова, Д. Фарин, Н.И. Тапильская 70

КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

- Профилактика инсульта у женщин – 2014**
Рекомендации Американской ассоциации сердца/
Американской ассоциации инсульта 77

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

- Сахарный диабет и беременность: счастливое материнство**
Г.В. Бабина 84

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Частота побочных эффектов при использовании метронидазола и орнидазола в клинической практике**
Ким Ен Дин 89

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Планування сім'ї». Частина I**
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 21 січня 2014 р. № 59* 92

НОВОСТИ

- ТОП 5. Гинекология** 36
ТОП 5. Акушерство 68



Негормональна корекція дисгормональних порушень



- НОВИЙ ВИРОБНИК – НІМЕЧЧИНА**
- ФІБРОЗНО-КІСТОЗНА МАСТОПАТІЯ
 - ГІПЕРПЛАЗІЯ ЕНДОМЕТРІУ • ЕНДОМЕТРІОЗ
 - ФІБРОМІОМА МАТКИ • КІСТИ ЯЄЧНИКІВ



НАТУРАЛЬНИЙ ОНКОПРОТЕКТОР
З АНТИПРОЛІФЕРАТИВНОЮ ДІЄЮ

**Надійний захист
від зростання пухлин
в гормонозалежних
органах**



індол-3-карбінол (I3C) – 200 мг
епігаллокатехін-3-галлат (EGCG) – 45 мг

Tazalok™ – комбінований негормональний лікарський засіб. Виявляє селективну антиестрогенну активність, призводить до ритмічного вироблення і нормалізації співвідношення гонадотропних гормонів, сприяє зменшенню рівня пролактину та підвищенню рівня прогестерону, усуває дисбаланс між естрадіолом і прогестероном, нормалізує другу фазу менструального циклу, а також чинить антипроліферативну, протизапальну, резорбтивну, седативну та загальнозмичуючу дію. Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, період вагітності і годування груддю, дитячий вік. Р/п UA/8499/01/01. Виробник: Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG, Germany (Штайнфельд 3, D-77736 Целль А.Х., Німеччина).

Epigalin® здійснює гальмування патологічних гіпер- та диспластичних процесів в гормон-залежних органах і тканинах жіночої репродуктивної системи, зменшує розвиток папіломатозу та ступінь дисплазії шийки матки, викликаних вірусом папіломи людини. За рекомендацією лікаря призначається для патогенетичної профілактики передпухлинних та пухлинних захворювань при лейоміомі матки, мастопатії, гіперплазії ендометрію, ендометріозі (в т.ч. аденоміозі, ендометріюїдних кістах), дисплазії шийки матки, аномальних кондиломах. Протипоказання: індивідуальна несприятливість, вагітність та період лактації. Не рекомендується одночасно вживати з кислотознижуючими засобами. Не є лікарським засобом. Висновок № 05.03.02-03/8663 від 19.02.2013 року. Виробник: BHI - Biohealth Int. GmbH, Germany *О.В.Грищенко, Н.Г.Грищенко, В.В.Соборницька //Репродуктивна ендокринологія.-2012-№4(6)-С.33-37 Інформація призначена виключно для медичних фахівців.