

№2(34), 2017

Reproductive Endocrinology
Scientific and Practical Medical Journal

Репродуктивна ендокринологія

Науково-практичний медичний журнал

Crossref, DOAJ, Index Copernicus International, About Open Academic Journals Index (Google Scholar, WorldCat, DRIVER, BASE), China National Knowledge Infrastructure (CNKI.net), CiteFactor, Research Bible, JournalTOCs, Universal Impact Factor, Advanced Science Index, General Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, IndianScience.in, Scientific Indexing Services, International Scientific Indexing (ISI), Open Journal Systems (OJS), eLIBRARY.ru (PIHЦ)

КЛІМОНОРМ

ЕСТРАДІОЛУ ВАЛЕРАТ/
ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ



- ☛ Сприяє покращенню психосоматичного статусу, самооцінки та когнітивних функцій¹
- ☛ Ефективно попереджає рецидиви ДМК у жінок в перименопаузі та менопаузі²
- ☛ Ефективно захищає ендометрій від гіперплазії^{2,3}

Коротчена інструкція для медичного застосування препарату КЛІМОНОРМ (KLIMONORM®)

Показання. Клімонорм призначений для замісної гормональної терапії (ЗГТ) у жінок, які страждають від симптомів естрогендефіциту внаслідок менопаузи. Існує обмежений досвід лікування жінок віком від 65 років. **Протипоказання:** рак молочної залози нині або в минулому, або підозра на нього; зльотні пухлини, що є естрогензалежними (наприклад, рак ендометрію), або підозра на них; вагінальна кровотеча нез'ясованої етіології; невилікувана гіперплазія ендометрію; венозна тромбоемболія нині або в анамнезі (наприклад, тромбоз глибоких вен, тромбоемболія легеневої артерії); наявні або нещодавно перенесені артеріальні тромбоемболічні порушення (наприклад, стенокардія, інфаркт міокарда); відома тромбофілія (наприклад, дефіцит протейну С, S або антитромбіну, див. розділ «Особливості застосування»); високий ризик розвитку венозного або артеріального тромбозу; пухлини печінки (доброкісні або злокісні) нині або в минулому; гострі захворювання печінки нині або в анамнезі до нормалізації лабораторних показників функціонального стану печінки; відома гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату; порфірія; тяжка гіпертригліцеридемія; вагітність чи підозрювана вагітність. **Клімонорм не слід призначати у період вагітності або годування груддю. Вплив на можливість керувати автомобілем і працювати з механізмами не вивчений.** **Спосіб застосування та дози.** Протягом перших 9 днів щоденно приймати по 1 таблетці жовтого кольору, після того протягом 12 днів щоденно приймати по 1 таблетці коричневого кольору. Після того, як протягом 3 тижнів будуть прийняті всі таблетки, настає семиденна перерва без прийому таблеток. У цей період слід очікувати появи чергової менструальноподібної кровотечі. РЛ.№ UA/3008/01/01

Література

1. Rudolph et al. Changes in Psychic and Somatic Well-Being and Cognitive Capabilities of Peri- and Postmenopausal Women After the Use of a Hormone Replacement Drug Containing Estradiol/Valerate and Levonorgestrel. Exp Clin Pharmacol 2000, 22(1): 514. 2. Кузнецова І. В., Якуткова М. В. Применение Климонаорма в качестве противорецидивной терапии дисфункциональных маточных кровотечений в перименопаузе // Гинекология - №2 - том 8/2006 - с 27-29. 3. Якутова М. В. Ведение женщин группы риска по развитию гиперплазии эндометрия в климактерии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, Москва, 2008г; 24 с.

Alvogen

Фармацевтична компанія нової генерації

Передплатний індекс - 60110

www.reproduct-endo.com

www.reproduct-endo.com.ua



ЗМІСТ

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Сучасні підходи до хірургічного та постхірургічного
медикаментозного ведення пацієнток із ендометріозом

Резолюція експертної ради

В.В. Камінський, Т.Ф. Татарчук, І.З. Гладчук, М. Мюллер та ін. 8

КЛІНІЧНА ЛЕКЦІЯ

Преждевременная недостаточность яичников:
синдром или диагноз

Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Т.Н. Тутченко 16

ГІНЕКОЛОГІЯ

Ендометрій у фокусі уваги гінеколога: роль гістероскопії та
імуногістохімії в діагностиці хронічного ендометриту, вибір
лікування

Т.Т. Кишакевич, Н.В. Коцабин, В.В. Радченко 24

Факторы риска рецидивирования гиперпластических
процессов эндометрия у женщин позднего репродуктивного
и перименопаузального возраста

С.М. Корниенко 28

Взгляд на проблему цитомегаловирусной и Эпштейна-Барр
вирусной инфекции в гинекологии и возможные
пути решения

П.С. Осипова, А.А. Суханова 32

Новини. TOP 5

40

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Современный подход к лечению инфекций мочевого пузыря
системы у беременных с сахарным диабетом

Г.В. Авраменко, А.В. Грибанов, И.В. Кривущенко 44

РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Терапевтичні можливості підготовки жінок
із безпліддям до ЕКЗ

Н.О. Данкович, О.М. Бабенко 53

ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ

Пищевые добавки фолиевой кислоты и беременность:
больше, чем просто профилактика дефектов нервной трубки

James A. Greenberg, Stacey J. Bell, Yong Guan, Yan-Hong Yu 57

Нужно ли лечить легкую преэклампсию?

А.Х. Каримов, Г.А. Ахмедова 64

ПУХЛИНИ ТА ПЕРЕДПУХЛИННА ПАТОЛОГІЯ

Проблемні питання діагностики трофобластичної хвороби

Н.Ю. Педаченко, О.І. Мухомор, К.Л. Аветисян, Ю.С. Денисенко 68

Кистозные изменения структуры молочной железы в разные
возрастные периоды

И.Л. Травина, А.Г. Попов, С.А. Попов, Е.В. Куликова 77

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Радіочастотні інтервенційні методи в лікуванні тазового болю

С.С. Новакович, Б.Б. Павлов 84

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

Неінвазивне пренатальне дослідження: клінічна ефективність
та деякі аспекти консультування вагітних

Результати аналізу понад 85 000 випадків

А.А. Taneja, H.L. Snyder, E. de Feo, K.M. Kruglyak та ін. 89

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

95

ДАРМАКОТЕРАПІЯ

Возможности применения мелатонина в гинекологии

Обзор литературы

И.В. Яроцкая, О.В. Занько 96



Прожестожель®

Швидка допомога та захист
молочної залози
при масталгії та мастопатії



Зменшує наявність
побічних впливів на
тканину молочної залози
при застосуванні КОК
та запобігає відмові
від терапії*



Діє локально, не має
системного впливу^{3,4}

1. Инструкция по застосуванню лікарського засобу РП № UA/3839/01/01 от 17.02.2016. 2. Barrat J et al. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1990; 19: 269-274. 3. Chang KJ, Lee TT, Linares-Cruz G, Fournier S, de Lingnieres B. Influences of percutaneous administration of estradiol and progesterone on human breast epithelial cell cycle in vivo. Fertil Steril 1995;63:785-791. 4. De Boever J, Verheugen C, Van Maele G, Vandekerckhove D. Steroid concentrations in serum, glandular breast tissue, and breast cyst fluid of control and progesterone-treated patients. Endocrinology of cystic breast disease. New York: Raven Press; 1983;93-99.



**BESINS
HEALTHCARE**

Innovation for Well-being