

Репродуктивна ендокринологія

Науково-практичний медичний журнал



Crossref, DOI, Index Copernicus International, About Open Academic Journals Index (Google Scholar, WorldCat, DRIVER, BASE), China National Knowledge Infrastructure (CNKI.net), CiteFactor, Research Bible, JournalTOCs, Universal Impact Factor, Advanced Science Index, General Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, Indian Science.in, Scientific Indexing Services, International Scientific Indexing (ISI), Open Journal Systems (OJS), eLIBRARY.ru (PNU)

Прогінова – просте рішення!

Склад: діюча речовина: естрадіол валерат; 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить 2 мг естрадіолу валерату. **Фармакотерапевтична група:** Гормони статевих залоз і препарати, що застосовуються при патології статевих сфер. Естрогени. Код АТХ: G03C A01. **Показання:** Замісна гормональна терапія (ЗГТ) для лікування ознак та симптомів дефіциту естрогенів у жінок після повстання менопаузи. **Протипоказання:** Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого з допоміжних речовин препарату. Рак молочної залози, діагностований на даний момент, в анамнезі або підозра на нього. Злоякісні пухлини, що є естрогензалежними, або підозра на них (вагініальний рак, ендометрій). Гестальна кровотеча нез'ясованої етіології. **Невмішувана гіперплазія ендометрію.** Високі тромбоемболічні ризики (наприклад, тромбоз глибоких вен, тромбоемболія легочних артерій, що спостерігається нині або виникає у минулому). Артеріальні тромбоемболічні події (інфаркти, інсульти, інфаркти мієкардію), що спостерігаються нині або виникали у минулому. Схильність до розвитку тромбозів (наприклад, дефіцит протромбіну С, дефіцит протромбіну 5 або антитромбіну). Високі ризики розвитку венозного або артеріального тромбозу. Гострі захворювання печінки або наявність таких захворювань в анамнезі (якщо показники функції печінки не повернуться до норми). Також захворювання печінки. Порфірія. Прочіне печінки (сироговизня або жовтячка нині або в минулому). Також гіпертригліцеридемія. **Уваження:** По 21 таблетці, вкрита оболонкою, у блистері по 1 блистеру в картонній пакуванні. **Категорія відпуску:** За рецептом. РС № UA46850101 від 26.01.2013. **Виробник:** Деліфарм Польска С.А.С. Франція. **Інформація в цілому матеріалі призначена виключно для спеціалістів охорони здоров'я. Лікарський засіб має протипоказання. Етикет повинна міститися в інструкції для медичного застосування.** Представництво «Альвон Малея Оперейшнс (РФ) Лімітед», G2002, м. Київ, Броварський проспект, 3м. Тел./факс: (044) 517 75 00, (044) 517 18 08, (044) 517 23 29.



ЗМІСТ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Субфертильність: філософія і методологія проблеми И.З. Гладчук, В.В. Дощечкин	8
Пренатальна діагностика фенілкетонури и двусторонней агенезии почек у одного плода Н.П. Веропотвелян, Г.В. Макух, Л.Б. Чорна и др.	16
Аналіз частоти поліморфізму генів фолатного циклу в жінок із різних регіонів України: власне дослідження та огляд О.А. Фесай, Г.В. Стрелко, Г.В. Зайченко, В.В. Уланова	21
Вплив ожиріння на розвиток гіперплазії ендометрія в жінок різного віку О.О. Єфіменко, К.Д. Дейнюк	28

ГІНЕКОЛОГІЯ

Особливості гормонального гомеостазу в пацієнок із клімаксом на тлі ендометріозу Н.Ф. Захаренко, Н.В. Коваленко, І.М. Ретунська	34
Мио-инозитол: терапевтические возможности и прегравидарная подготовка при синдроме поликистозных яичников Обзор литературы Л.В. Калугина, Т.И. Юско	40
Психогенные стресс-зависимые нарушения менструального цикла: роль негормональной коррекции И.В. Кузнецова, М.Н. Бурчакова, Д.И. Бурчаков и др.	46
Парвовирус В19 в практике акушера-гинеколога О.А. Бурка, И.В. Сидорова	52
Евросоюз одобрил решение ЕМА по применению препарата Эсмия Прес-реліз	57
НОВИНИ. TOP 5	58

ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ

Профілактика акушерських ускладнень на тлі ретрохоріальної гематоми в І триместрі вагітності Огляд літератури Т.Г. Романенко, О.М. Суліменко	60
Материнська тромбофілія як предиктор виникнення акушерських ускладнень та перинатальних втрат у жінок із невиношуванням вагітності залежно від маси тіла Ю.М. Дука	68

ПУХЛИНИ ТА ПЕРЕДУХЛИННА ПАТОЛОГІЯ

Особливості соматичного статусу та клінічної характеристики раку молочної залози в жінок у період постменопаузи С.М. Грибач	76
---	----

ФАРМАКОТЕРАПІЯ

Ефективність нестероїдних протизапальних препаратів при лікуванні синдрому хронічного тазового болю Т.Г. Романенко, О.М. Суліменко	82
Залізодефіцит при ХСН Практична інфографіка	88
Применение лактулозы и лигнина в комплексном лечении пациенток с дисбиотическими процессами влагалища И.В. Антоненко	90

Швидка допомога
та захист молочної
залози при масталгії
та мастопатії



Таргетна патогенетична
терапія дисгормональних
дисплазій МЗ без
системного впливу [1-4]

З першої фази
менструального циклу в
безперервному режимі [1]

1. Инструкция по застосуванню лікарського засобу РП № UA/3839/01/01 от 17.02.2016. 2. Barral J et al. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1990; 19: 269-274. 3. Chang KJ, Lee TT, Linares-Cruz G, Fournier S, de Lingnieres B. Influences of percutaneous administration of estradiol and progesterone on human breast epithelial cell cycle in vivo. Fertul Steril 1995; 63: 785-791. 4. De Boever J, Verheugen C, Van Maele G, Vandekerckhove D. Steroid concentrations in serum, glandular breast tissue, and breast cyst fluid of control and progesterone-treated patients. Endocrinology of cystic breast disease. New York: Raven Press, 1983; 93-99.