

Репродуктивна ендокринологія

Науково-практичний медичний журнал

Crossref, DOAJ, Index Copernicus International, About Open Academic Journals Index (Google Scholar, WorldCat, DRIVER, BASE), China National Knowledge Infrastructure (CNKI.net), CiteFactor, Research Bible, JournalTOCs, Universal Impact Factor, Advanced Science Index, General Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, Indian Science.in, Scientific Indexing Services, International Scientific Indexing (ISI), Open Journal Systems (OJS), eLIBRARY.ru (PIHIC)

Alvogen

Прогінова – просте рішення!

Склад: діюча речовина: естрадіол валерат; 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить 2 мг естрадіолу валерату. **Фармакотерапевтична група:** Гормони статевих залоз і препарати, що застосовуються при патології статевих органів. Естрогени. Код АТХ: G03C A03. **Показання:** Замісна гормональна терапія (ЗГТ) для лікування ознак та симптомів дефіциту естрогенів у жінок після настання менопаузи. **Протипоказання:** Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату. Рак молочних залоз, діагностований на даний момент, в анамнезі або підозра на нього. Злоякісні пухлини, що є естрогензалежними, або підозра на них (наприклад, рак ендометрію, гістальна карцинома шийки матки тощо). **Невизначена гіперплазія ендометрію:** Високий тромбоемболічний ризик (наприклад, тромбоз глибоких вен, тромбоемболія легеневої артерії), що спостерігається нині або виникає у минулому. Атеросклеротичні тромбоемболічні події (наприклад, інфаркти міокарда, що спостерігаються нині або виникали у минулому). Сильність до розвитку тромбозу (наприклад, дефіцит протеїну С, дефіцит протеїну S або антитромбін). Високий ризик розвитку веніозного або артеріального тромбозу. Гострі захворювання печінки або наявність таких захворювань в анамнезі (показники функції печінки не повернуться до норми). Тяжкі захворювання печінки, в хронічній формі. Пухлинні захворювання або зловияки нирок або в минулому. Також ішемія мієгрена. **Уваження:** По 21 таблетці, вкритих оболонкою, у blister, по 1 blister у картонній упаковці. Категорія відпуску: За рецептом. РС № UA4865/01/01 від 26.01.2015. **Виробник:** Дельфарм Гольф С.А.С., Франція. Інформація в цьому матеріалі призначена виключно для спеціалістів охорони здоров'я. Лікарський засіб має протипоказання. Більш повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування. Представництво «Альвон Мідлста Оперейшнс (РФ) Лмітед», 02002, м. Київ, Броварський проспект, 5а. Тел./факс: (044) 517 75 00, (044) 517 18 08, (044) 517 23 23.

Передплатний індекс - 60110

www.reproduct-endo.com
www.reproduct-endo.com.ua



ЗМІСТ

ГІНЕКОЛОГІЯ

- Поліпоз ендометрія: оптимізація протизапальної терапії
Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, О.В. Занько, Т.І. Юско 8

- Сучасний погляд на оптимальну терапію ВПЛ-асоційованої патології
шийки матки на тлі вагінального дисбіозу
О.А. Таран, О.В. Булаченко, Д.Г. Коньков, Т.В. Лобастова 16

- НОВИНИ. TOP 5 22

МЕНЕДЖМЕНТ КЛІМАКТЕРІЮ

- Репродуктивні, клінічні та біологічні маркери перименопаузи
Огляд літератури
О.О. Єфіменко, І.М. Ретунська, О.С. Зеленько 24

ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ

- Сучасні погляди на лікування плацентарної дисфункції
у вагітних після ЕКЗ
О.В. Кравченко 30

ПУХЛИНИ ТА ПЕРЕДУХЛИННА ПАТОЛОГІЯ

- Гормональний статус пацієнток після хірургічного лікування
фіброзно-кістозної мастопатії
Ю.Я. Присташ 36

ЗАПИТАЙ У ЛІКАРЯ

- Что нового в диагностике и лечении синдрома аномальных
вагинальных выделений?
Интервью с д. мед. н., проф. Т.Ф. Татарчук 40

ФАРМАКОТЕРАПІЯ

- Повидон-йод (Бетадин)
в современной акушерско-гинекологической практике
Е.Н. Носенко, Т.Я. Москаленко, А.В. Рутинская 43

- Огляд міжнародних наукових даних щодо використання
Поліжинаксу в лікуванні та профілактиці вагінітів різної етіології
Є.Ф. Кіра, А.М. Савічева 50

- Экстракт цимицифуги ZE 450 стабилизирует вес женщин в менопаузе
Пресс-релиз 59

- Оцінка ефективності використання препарату Cicatridina®
для загоєння і відновлення шийки матки, піхви і зовнішніх
статевих органів жінки
Нерандомізоване клінічне дослідження
Я. Марковська, А. Марковська, Р. Мадре 60

- Безопасность лекарственных средств
Применение улипристала ацетата в гинекологии
А.А. Суханова, Ю.Н. Мельник, А.Б. Гордийчук 64

- Клинический случай анемии у пациентки с эндометриозом
Т.Ф. Татарчук 72

Естрожель® +
Утрожестан® –
нова парадигма МГТ



- Протективний ефект прогестерону щодо гіперплазії ендометрію не відрізняється від інших гестагенів¹.
- Мікронізований прогестерон НЕ підвищує ризик раку молочної залози.^{1,2}
- Тому оптимальним вибором гестагену у складі комбінованої МГТ є застосування мікронізованого прогестерону

1. Gompel A. Climacteric 2012; 15(1): 18–25.
2. A Fournier, F Berrino, F Clavel Chapelon: Unequal risks for breast cancer associated with different hormone replacement therapies: Results from the E3N cohort study. Breast Cancer Res Treat 107:103-111, 2008.

Реєстраційне посвідчення Естрожель®
№UA/4120/01/01 від 16.03.2016.

Реєстраційне посвідчення УТРОЖЕСТАН®
UA/2651/01/01, № UA/2651/01/02 від 23.09.2013.