

Сімейна медицина

ISSN 2307-5112

№3 (83) '2019

ЖУРНАЛ ВИХОДИТЬ
3 ВЕРЕСНЯ 1999 РОКУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ.
СИСТЕМНА СКЛЕРОДЕРМІЯ:
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
НА ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКУ,
ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ

7

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТОПІЧНОЇ
ТЕРАПІЇ МІКОЗУ СТОП

17

КОМУНІКАЦІЙНА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

31

ТРИВОЖНІСТЬ ТА ДЕПРЕСИВНІ
СТАНИ В УЧАСНИКІВ АТО/ООС,
ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ
ГІПЕРТЕНЗІЮ

43

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ
ВАРІАБЕЛЬНІСТЮ РИТМУ
І СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИМ
СТАНОМ СЕРЦЯ У ПАЦІЄНТІВ
З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

74

ДЕФІЦИТ ВІТАМІНУ В₁₂
У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ
І МОЖЛИВІСТЬ ВПЛИВУ
НА НЬОГО ХАРАКТЕРУ
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО
ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО
ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ

97

ЧОТИРИ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ СПОКІЙНОГО ЖИТТЯ І МІЦНОГО СНУ!

GRANDMEDICAL
group

УСУВАЄ
ПРИЧИНИ
БЕЗСОННЯ!!!*



- ПСИХОЕМОЦІЙНІ ТА ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ
- НЕВРОЗИ ТА НЕВРАСТЕНІЇ
- ПІДВИЩЕНА ДРАТІВЛИВІСТЬ
- ТРИВОГА
- ДЕПРЕСІЯ
- ПМС, МЕНОПАУЗА
- СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ

ВІДНОВЛЮЄ
СОН*

*ПАРІ-ФЛО 30 капсул у блістерах

Склад: 1 капсула містить: екстракт трави пасифлори сухий (*Passiflora incarnata L., herba extractum*) – 150 мг, L-гліцин – 100 мг, L-метилфолат – 0,50 мг, магнію L-трионат – 150 мг. **Рекомендації до застосування:** при психоемоційних та психосоматичних розладах, викликаних стресами, вегето-судинною дистонією, артеріальною гіпертензією, гормональними порушеннями (клімакс, передменструальний синдром, гіпертиреоз та ін.), при неврозах та неврастенії різного генезу, при підвищеній дратівливості, станах страху, неспокою, тривоги, при депресивних станах, при нападах мігрені, при судорожному синдромі на тлі неврологічних захворювань та метаболічних порушень, при алкогольній абстиненції. **Протипоказання:** не приймати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів. **Спосіб застосування та рекомендована добова доза:** по 1 капсулі 2 рази на добу. Рекомендований курс прийому становить 7-14 днів. Перед застосуванням рекомендується консультація у лікаря. Не застосовувати як заміник повноцінного і збалансованого харчування! Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не є лікарським засобом! Інформація для фахівців охорони здоров'я. Повна інформація розміщена в листку-вкладці. **Виробник:** Grand Medical Poland Sp. z o.o. Michała Faradaya 2, 03-233 Warsaw, Poland, tel. +48 22 35 00 270, fax +48 22 35 00 277 для Grand Medical Group AG, Switzerland. **Представник:** Представництво "Гранд Медикал Груп АГ" в Україні, 04112 Київ, вул. Дегтярівська, 62. Тел. +38 044 209 95 47.

СОДЕРЖАНИЕ 3 (83) / 2019

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Системная склеродермия: современный взгляд на патогенез, клинику, диагностику и лечение
И.Ю. Головач, Е.Д. Егудина 7

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- Новые возможности топической терапии микоза стоп
О.И. Кропивницкая 17
- The significance of hereditary factor in the development of chronic kidney disease (glomerulonephritis)
V.Ya. Kaminskyi 20
- Навчання пацієнтів як невід'ємна складова комплексного підходу у лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу
Л.Ф. Матюха, Б.О. Сміль 26
- Комунікаційна компетентність сімейного лікаря – від інтернатури до повсякденної практичної діяльності
Л.М. Пасієнвілі, А.А. Заздранюк 31

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

- Судинне ремоделювання при різній активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з коморбідністю артеріальної гіпертензії та ожиріння
В.Г. Псарьова 34
- Особливості продукції IFN- α у хворих на рецидивуючу герпесвірусну інфекцію 1-го та 2-го типів
Н.М. Горбаль, К.Е. Ішейкін, Г.О. Потьомкіна, І.Г. Гайдучок, І.Й. Кріль, В.В. Чон'як 37
- Тривожність та депресивні стани в учасників АТО/ООС, хворих на артеріальну гіпертензію
М.М. Козачок, М.М. Селюк, М.І. Омелянко, І.М. Савчук, О.В. Селюк 43
- Частота поліморфних варіантів G894T гена ендотеліальної NO-синтази у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та надмірною масою тіла
В.С. Потаскалова, М.В. Хайтович, Л.В. Натрус, Ю.С. Осадчук 47
- Современный взгляд на проблемы диагностики и терапии анемии хронических заболеваний
С.А. Гусева, С.В. Луценко 52
- Клінічна ефективність диференційованої корекції стану контактно-захисних систем при хронічних дерматозах у практиці сімейного лікаря
Л.В. Черкашина 57

- Надання лікарями загальної практики-сімейними лікарями акушерсько-гінекологічної допомоги та характеристика взаємозв'язку первинної ланки з акушерсько-гінекологічними службами: за результатами соціологічного дослідження
О.С. Щербіньська, Г.О. Слабкий 63

КАРДИОЛОГИЯ

- Визначення факторів настання кардіоваскулярної смерті у віці до 80 років в осіб похилого віку з ішемічною хворобою серця
В.Ю. Жаріпова, Г.П. Войнаровська, І.С. Шаповаленко, Л.О. Бодрецька, Ж.С. Бутинець, В.О. Табакович-Вацеба, В.О. Кузнецова 68
- Взаимосвязь между вариабельностью ритма и структурно-функциональным состоянием сердца у пациентов с церебральным атеросклерозом
В.Е. Кондратюк, М.С. Егорова, Е.А. Кононенко 74
- Оцінювання ефективності та переносимості комбінації L-карнітину та аргініну гідрохлорид у пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги
І.М. Фуштей, С.Л. Подсевахіна, О.С. Чабанова, О.В. Ткаченко 81

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

- Ефективність використання препарату рослинного походження у комплексному лікуванні хворих з гострим неускладненим пієлонефритом
О.Б. Унгурян 86
- Ефективність комбінації лізіноприлу та амлодипіну у веденні пацієнтів з гіпертонічною хворобою у коморбідності з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок у сімейній практиці
Л.С. Бабінець, В.В. Білочницька 89
- Изучение взаимосвязи уровней мозгового натрийуретического пептида с частотой обострений и степенью ограничения воздушного потока у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких
Бен Аммар Сауссен, О.С. Комиссарова, Н.В. Кича, Л.В. Черкашина 93

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

- Дефіцит вітаміну B₁₂ у людей літнього віку і можливість впливу на нього характеру медикаментозного лікування цукрового діабету 2-го типу
Л.А. Стаднюк, О.А. Коваленко, О.В. Давидович, М.В. Олійник 97