

Здоровье мужчины

ISSN 2307-5090



№4(59) '2016

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С МАЯ 2002 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ

**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
ХРОНИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ
ПРОСТАТИТ: ЭТИОЛОГИЯ,
ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА
И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ** 6

**МУЖЧИНА В ХХІ ВЕКЕ:
ПРОБЛЕМЫ ПОЗДНЕГО
ГИПОГОНАДИЗМА** 13

**НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМ,
ОСЛОЖНЕННЫМ ИНФЕКЦИЕЙ
ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ** 18

**ПРОБЛЕМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
БАКТЕРИЙ К АНТИБИОТИКАМ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В УРОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ** 71

**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА МАЛЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
ПОЧКИ** 105

1 вибір року
в Україні*

No

ВІАГРА®
оригінальний силденафіл

ТВЕРДИЙ ВІБІР УСПІШНИХ ЧОЛОВІКІВ



**ВІАГРА БУЛА ПРИЗНАЧЕНА 587 МІЛЬЙОНІВ РАЗІВ,
БІЛЬШ НІЖ МІЛЬЙОНОМ ЛІКАРІВ****

ВІАГРА® (силденафіл, таблетки верит) ліківкою оболонкою, по 50 мг: 1 або 4 таблетки в упаковці: 100 мг: 1, 2, 4, 8 таблеток в упаковці.
Коротка інструкція для медичного застосування препарату ВІАГРА®. Показання. Лікування порушень ерекції, що викликані як недостатністю досягти та підтримати ерекцію статевго члена, необхідну для успішного статевго акту. Для ефективного дії препарату ВІАГРА® необхідні сексуальні збудження. Спосіб застосування та дози. Препарат застосовувати перорально. Рекомендована доза препарату ВІАГРА® становить 50 мг та застосовується, при необхідності, приблизно за годину до статевго акту. Максимальна рекомендована доза становить 100 мг. Максимальна рекомендована частота застосування препарату становить 1 раз на добу. Протипоказання. Підвищена чутливість до активної речовини або будь-якої з допоміжних речовин препарату; одночасне застосування із дилаторами оксиду азоту (гасим, як амілітрид) або нітратами у будь-якій формі протипоказано. Силденафіл протипоказаний чоловікам, яким не рекомендовано статевго активність. Втрата зору на одне або інше око: інсульт неартеріального походження, неврапаті зорового нерва незалежно від того, пов'язана ця патологія із попереднім застосуванням ВІАГРА® ФДЕ 5 ч н. Наявність таких захворювань, як порушення функції печінки такого ступеня, артеріальна гіпотензія (артеріальний тиск нижче 90/50 мм рт. ст.), нещодавно перенесений інсульт або інфаркт міокарда та відомі стадії дегенеративні захворювання стовіа, такі як пізній етап білезіа. Велика кількість таких пацієнтів має генетичні розлади фосфодіестерази стовіа, оскільки безпечно силденафілу не досліджувалася у таких пацієнтах. Побічні реакції. Найчастіше повідомлялися про такі побічні реакції, як головний біль, припливи крові, диспепсія, розлад жоду, запор, задишка, запорошення та порушення сприйняття кольору. Особливості застосування. Особливі сексуальні активність супроводжується певним ризиком з боку серця, до початку будь-якого лікування еректильної дисфункції лікар

має оцінити стан серцево-судинної системи пацієнта. Засоби для лікування еректильної дисфункції, у тому числі й силденафіл, слід призначати з обережністю пацієнтам із анатомічними деформациями пеніса (паніми як ангуляція, кавернозний фіброз або кривизна Пейроні), або пацієнтам зі спонділі, що сприяють розвитку протипау, Вазомоді з іншими лікарськими засобами. При дослідженні in vivo силденафіл має вплив на метаболізм оксиду азоту/цианічного гуанозинмонофосфату (цГМФ), було встановлено, що цей препарат потенціює гіпотензивну дію нітрата, тому його одночасне застосування з дилаторами оксиду азоту або з нітратами в будь-якій формі протипоказано. Категорія відпуску. За рецептом. Перед використанням препарату необхідно ознайомитися з інструкцією для медичного застосування та проконсультуватися з лікарем. Інформація для лікарів і фармацевтів. Призначено для розповсюдження на симпозіах, симпозіах, конференціях з медичної тематики. Реєстраційні посвідчення № UA/0313/01/02, № UA/0313/01/03 від 15.04.2013, Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 537 від 20.08.2015. За додатковою інформацією звертайтеся до: Представництва «Файзер Ен. С. П. Корпорація» в Україні: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12. Бізнес-центр «Горизонт парк», тел.: (044) 391-60-50.

Література:
*Звіт незалежного аудиторів щодо дотримання Організацією німат
"Положення про Міжнародний фестиваль - конкурс
"Вибір року в Україні" під час формування рейтингу в 2015 році
** - Data on file

WUKVGR0215032



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Хронічний калькульозний простатит: етіологія, патогенез, діагностика та сучасні методи лікування
В.В. Спиридоненко6

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- Актуальні проблеми лікування та профілактики доброякісної гіперплазії передміхурової залози (за матеріалами 12-го Південно-східного європейського мітингу SEEM Європейської асоціації урологів)
С.М. Шамраєв11
- Мужчина в XXI веке: проблемы позднего гипогонадизма
И.И. Горпинченко, В.В. Спиридоненко13

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

- Нове у лікуванні хворих на нефролітаз, ускладнений інфекцією верхніх сечових шляхів
С.О. Возіанов, Д.В. Коваль, А.В. Руденко, Н.І. Желтовська18
- Исследование эффективности препарата Тамсин Форте в лечении мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы
И.И. Горпинченко, Ю.Н. Гурженко, В.В. Спиридоненко, С.А. Костюченко, В.М. Красовский23
- Вплив інфравезикальної обструкції, зумовленої доброякісною гіперплазією передміхурової залози, на патофізіологічні зміни сечового міхура у пацієнтів з метаболічним синдромом
А.І. Бойко, О.В. Шмυлїченко26
- Impact of operations upon systematic microcirculation in case of pyeloureteral junction obstructions
O.V. Shypelyk, A.Z. Zhuravchak, D.Z. Vorobets31

СЕКСОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ

- Исследование эффективности препарата Эверест в терапии эректильной дисфункции
И.И. Горпинченко, Ю.Н. Гурженко, В.В. Спиридоненко34
- Особливості сексуальних розладів у чоловіків із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки
Ю.М. Гурженко, В.В. Сорока40
- Ефективність та переносимість дієтичної добавки Катарсис Форте у пацієнтів з еректильною дисфункцією
І.І. Горпинченко, А.М. Ситенко46
- Классификации оргазма и пути его достижения
Г.С. Кочарян52
- Оцінка психоемоційного стану чоловіків із сексуальними розладами та симптомами порушення нижнього сечового тракту
Ю.М. Гурженко, М.Д. Квач63

- Зміни показників спермограми та рівня фолікулостимулювального гормону у хворих на семіному яєчка І стадії після ад'ювантної терапії карбоплатином
А.В. Сакало68

УРОЛОГИЯ

- Проблемы резистентности бактерий к антибиотикам и пути их решения в урологической практике
И.Г. Березняков71
- Современные представления об антибактериальной терапии нозокомиальных инфекций мочевых путей
О.Д. Никитин77
- Контроль хемолітичної активності фітотерапії за допомогою променевої діагностики у пацієнтів з уролітіазом єдиної нирки
С.О. Возіанов, О.Л. Мороз, А.Ю. Гурженко83

МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

- Дослідження ефективності та безпечності використання препарату Епадол Нео при лікуванні хворих на екскреторно-токсичне безпліддя
Є.А. Литвинець, В.Є. Литвинець-Кондрат90
- Антиоксидантна терапія пацієнтів з екскреторно-токсичною безплідністю при хронічному абактеріальному простатиті
К.Р. Нуріманов, В.С. Савченко, Т.В. Порошина, О.А. Недогонова, Г.М. Драннік95
- Эффекты препарата Простекс (ректальные суппозитории с простатиленом) у пациентов с простатическим болевым синдромом
И.И. Горпинченко, А.М. Сытенко99

ОНКОУРОЛОГИЯ

- Диференційна діагностика малих ниркових новоутворень: ефективність застосування вимірюваного коефіцієнта дифузії дифузійно-зважених зображень МРТ в якості променевого біомаркери нирково-клітинного раку
Ю.О. Мицик, І.Ю. Дутка, Ю.Б. Борис, І.М. Комнацька, І.В. Дац, Н.В. Чернова, Д.З. Воробець105
- Експресія CD44 та CD24 у пухлинній тканині у хворих на рак передміхурової залози
Ю.В. Жильчук, В.С. Сакало, В.М. Григоренко, А.В. Сакало, Т.В. Задворний, М.Ю. Лук'янова, В.Ф. Чехун111
- Роль біомаркерів та геномних факторів при активному спостереженні у хворих на рак передміхурової залози
С.В. Головкин, О.Ф. Савицький115