

Здоровье мужчин

ISSN 2307-5090



№1 (68) '2019
ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С МАЯ 2002 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ

**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
РОЛЬ ПРОЛАКТИНА
И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ
У МУЖЧИН**

9

**ПОЛИКОМПОНЕНТНАЯ
ФИТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

27

**ИНГИБИТОРЫ
ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ
5-ГО ТИПА И ЭРЕКТИЛЬНАЯ
ДИСФУНКЦИЯ**

64

**ТРАНССЕКСУАЛЬНОСТЬ:
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
И КЛИНИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ**

80

**АНАЛИЗ АНАТОМИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
НЕДЕРЖАНИЮ МОЧИ
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ
ПРОСТАТЕКТОМИИ**

92

**МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА
АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ
УКРАИНЫ**

98



Флосін®

тискулову гідрохлорид 0,4 мг

Лікування функціональних розладів з боку нижніх сечовивідних шляхів при доброякісній гіперплазії передміхурової залози¹

- Швидкий початок дії²
- Уроселективний³, не викликає клінічно значущого зниження АТ⁴
- Діє цілодобово⁴



Простамол® Уно

густого сечовивідного екстракту із плодів пальми пилкозайової (Cientia persea) 320 мг

Розлади сечовивідання при доброякісній гіперплазії передміхурової залози I та II стадії та хронічному простатиті по класифікації Alken¹

- Гальмування росту тканин передміхурової залози¹
- Зменшення розладів сечовивідання¹
- Протизапальна дія¹
- Не впливає на статеву функцію¹

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу ФЛОСІН® (FLOSIN®)¹

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Капсули тверді з модифікованим вивільненням. **ПОКАЗАННЯ.** Лікування функціональних розладів з боку нижніх сечовивідних шляхів при доброякісній гіперплазії передміхурової залози по класифікації Alken. **ПРОТИПОКАЗАННЯ.** Підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату. **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ.** Застосовувати по 1 капсулі 1 раз на день після їди. **ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ:** запаморочення, головний біль, нирковий біль, відчуття серцебиття, ортостатична гіпотензія, риніт, запор, діарея, нудота, блювота, втомленість, сонливість, кропив'янка, ангіоневроз, розлади ерекції, виліслюючий ретроградний еякуляційний дисфункція, перитонізм, астеничний стан. **КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ.** За рецептом. ¹ За повною детальною інформацією звертайтеся до інструкції для медичного застосування препарату ФЛОСІН®, затвердженої наказом МОЗ України № 1635 від 07.09.2018, РП № UA/8350/01/01. Виробник Флосін® - Менаріні - Фін Хейден ГітХ, Німеччина. Місцезнаходження: Лейпциг, Німеччина. 7-13, 01097, Дрезден, Німеччина.

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу ПРОСТАМОЛ® УНО (PROSTAMOL® UNO)¹

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Капсули м'які. **ПОКАЗАННЯ.** Розлади сечовивідання при доброякісній гіперплазії передміхурової залози I та II стадії та хронічному простатиті по класифікації Alken. **ПРОТИПОКАЗАННЯ.** Підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату. **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ.** Застосовувати по 1 капсулі 1 раз на день після їди. **ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ:** запаморочення, головний біль, нирковий біль, відчуття серцебиття, ортостатична гіпотензія, риніт, запор, діарея, нудота, блювота, втомленість, сонливість, кропив'янка, ангіоневроз, розлади ерекції, виліслюючий ретроградний еякуляційний дисфункція, перитонізм, астеничний стан. **КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ.** Без рецепта. ¹ За повною детальною інформацією звертайтеся до інструкції для медичного застосування препарату ПРОСТАМОЛ® УНО, затвердженої наказом МОЗ України № 1664 від 12.09.2018, РП № UA/10417/01/01. Виробник Простамол® Уно - BERLIN-CHEMIE AG, Місцезнаходження: Глінкер Бер 125, 12489, Берлін, Німеччина.

1. Інструкція для медичного застосування препарату Простамол® Уно, затверджена наказом МОЗ України № 1664 від 12.09.2018, РП № UA/10417/01/01. 2. Leporin Phase III multicenter placebo-controlled study of tamsulosin in benign prostatic hyperplasia. Tamsulosin Investigator Group/Urology 1998. Jun. 51(6):892-900. 3. Lowe FC. Summary of Clinical Experiences with Tamsulosin for the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Reviews in Urology 2005;7(Suppl 4):S13-S21. 4. Інструкція для медичного застосування препарату ФЛОСІН®.

За додатковою інформацією щодо лікарських засобів звертайтеся до Представництва «Берлін-Хемі/А. Менаріні Україна ГітХ» в Київ, 02098, вул. Березняківська, 29. Тел. 494 33 88. Факс: 494 33 89. Інформація про лікарські засоби. Інформація для професійної діяльності медиків / Фармацевтичних працівників. UA, Prost Flos - 02-2018_V1_Prest. Останній перегляд 25.09.2018.



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

СОДЕРЖАНИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Роль пролактина и диагностическое значение гиперпролактинемии у мужчин И.И. Горпинченко, В.В. Спирidonенко.....	6
--	---

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Порівняльна характеристика ефективності та ускладнень фотоселективної вапоризації (120 Вт) та біполярної резекції доброякісної гіперплазії передміхурової залози С.В. Головка, В.Р. Балабанік.....	11
Неантибактериальная растительная терапия (BNO 1045) в сравнении с антибактериальной терапией (фосфомицина трометамол) при лечении острых неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей у женщин: двойное слепое, в параллельных группах, рандомизированное многоцентровое исследование меньшей эффективности фазы III Флоріан М. Вагенленер, Дмитрій Абрамов-Соммаріва, Мартіна Геллер, Губерт Штайндль, Курт Г. Набер.....	17
Полікомпонентна фітотерапія у лікуванні при захворюваннях передміхурової залози І.І. Горпинченко, Ю.М. Гурженко, В.В. Спирidonенко.....	27

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Risk factors of early postoperative complications in their interaction with results of transurethral resection of prostate in patients with benign prostatic hyperplasia S.P. Pasiechnikov, N.O. Saidakova, Abdulfatah Ahmed Moallim.....	32
Профілактика ускладнень у пацієнтів із сечокам'яною хворобою на тлі цукрового діабету 2-го типу після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії та контактної уретеролітотрипсії А.І. Бойко, Д.І. Купрін.....	35
Эффективность и безопасность базовой фармакотерапии хронического абактериального простатита К.Р. Нуриманов.....	40
Роль і місце менопаузальної гормональної терапії у лікуванні симптомів нижніх сечовивідних шляхів у жінок віком понад 40 років О.І. Яцина, О.О. Єфіменко.....	46

Оценка эффективности и переносимости препарата Нормовен в комплексной терапии хронического бактериального простатита А.М. Корниченко, М.А. Щербак.....	54
---	----

СЕКСОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ

Редкий клинический случай синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи Г.С. Кочарян.....	60
Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа и эректильная дисфункция Ю.Н. Гурженко.....	64
Исследование эффективности диетической добавки Либедор у мужчин с эректильной дисфункцией И.И. Горпинченко, Ю.Н. Гурженко, В.В. Спирidonенко.....	75
Транссексуальность: диагностические подходы и клиническое наблюдение Г.С. Кочарян.....	80

УРОЛОГИЯ

Ефективність екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії у лікуванні сечокам'яної хвороби В.А. Слободянюк.....	86
---	----

ОНКОЛОГИЯ

Негенітоуринарні ускладнення радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози: результати п'ятирічного одноцентрового когортного дослідження С.О. Возіанов, С.М. Шамраєв, А.М. Леоненко.....	89
---	----

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

Аналіз анатомічних факторів, що сприяють нетриманню сечі після радикальної простатектомії (Огляд літератури) С.В. Головка.....	92
---	----

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ УКРАИНЫ

Перший досвід симультанної передочеревинної пластики пахвинних гриж під час виконання одномоментної залобкової простатектомії В.О. Шаурицький, В.І. Горовий, І.В. Барало, О.М. Калшук, Ю.Б. Потеха, О.Л. Кобзін, А.І. Мисак.....	96
ТЕЗИСЫ.....	98